

悪性新生物 部位順位表 性別・年齢別

性別	年齢階層	順位 患者数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
男 3,990人	1歳未満	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1～9	11	リンパ性白血病 9	骨髄性白血病 1	その他の結合組織及び軟部組織 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10～19	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20～29	13	骨髄性白血病 6	非ホジキンリンパ腫のその他及び詳細不明の型 3	歯肉 1	胸腺 1	リンパ性白血病 1	結腸 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30～39	36	リンパ性白血病 5	陰茎 4	精巣<睾丸> 4	甲状腺 4	気管支及び肺 4	直腸S状結腸移行部 3	結腸 3	副鼻腔 3	胃 2	膀胱 2	呼吸器及び消化器の続発性 1	末梢性及び皮膚T細胞リンパ腫 1	ホジキン<Hodgkin>病 1	鼻腔及び中耳 1	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞腫瘍 1	—
	40～49	97	気管支及び肺 20	胃 16	直腸S状結腸移行部 7	直腸 7	肝及び肝内胆管 6	扁桃 5	腎盂を除く腎 4	舌根<基底>部 4	精巣<睾丸> 3	びまん性非ホジキンリンパ腫 3	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞腫瘍 3	結腸 3	骨髄性白血病 3	胸腺 3	副鼻腔 2	その他 2
	50～59	362	気管支及び肺 77	脾 55	結腸 35	胃 27	食道 21	直腸 16	膀胱 16	肝及び肝内胆管 15	前立腺 14	骨髄性白血病 9	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞腫瘍 8	その他及び部位不明の舌 7	リンパ性白血病 6	ろく濾>胞性非ホジキンリンパ腫 5	腎盂を除く腎 5	その他 5
	60～69	1,229	気管支及び肺 248	胃 128	結腸 92	脾 89	食道 89	肝及び肝内胆管 80	膀胱 78	前立腺 76	直腸 42	びまん性非ホジキンリンパ腫 37	骨髄性白血病 35	骨髄異形成症候群 28	その他及び部位不明の胆道 19	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞腫瘍 16	直腸S状結腸移行部 15	その他 15
	70～79	1,465	気管支及び肺 302	胃 236	結腸 107	肝及び肝内胆管 95	前立腺 84	脾 76	膀胱 73	びまん性非ホジキンリンパ腫 62	食道 59	骨髄性白血病 36	その他及び部位不明の胆道 29	骨髄異形成症候群 28	直腸 27	胆のうく囊> 21	リンパ性白血病 18	その他 212
	80～89	750	気管支及び肺 135	胃 94	膀胱 76	肝及び肝内胆管 63	びまん性非ホジキンリンパ腫 52	結腸 35	その他及び部位不明の胆道 30	脾 30	骨髄性白血病 24	前立腺 20	骨髄異形成症候群 18	直腸S状結腸移行部 16	食道 16	直腸 16	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞腫瘍 13	その他 118
90歳以上	27	膀胱 4	気管支及び肺 4	ホジキン<Hodgkin>病 3	びまん性非ホジキンリンパ腫 3	前立腺 2	肝及び肝内胆管 2	脾 2	その他及び部位不明の泌尿器 2	リンパ節の続発性及び部位不明 1	皮膚のその他 1	小腸 1	胃 1	結腸 1	—	—	—	
女 2,469人	1歳未満	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1～9	2	リンパ性白血病 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10～19	6	骨髄性白血病 3	甲状腺 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20～29	10	骨髄性白血病 3	甲状腺 3	子宮頸(部) 2	卵巣 1	脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30～39	61	乳房 14	子宮頸(部) 13	結腸 7	皮膚の悪性黒色腫 6	びまん性非ホジキンリンパ腫 4	甲状腺 4	胃 3	卵巣 2	腎盂を除く腎 2	呼吸器及び消化器の続発性 2	気管支及び肺 1	非ホジキンリンパ腫のその他及び詳細不明の型 1	リンパ節の続発性及び部位不明 1	直腸S状結腸移行部 1	脳 1	—
	40～49	224	乳房 66	子宮頸(部) 29	骨髄性白血病 17	胃 15	子宮体部 15	気管支及び肺 15	卵巣 10	びまん性非ホジキンリンパ腫 9	結腸 6	ろく濾>胞性非ホジキンリンパ腫 6	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞腫瘍 5	甲状腺 5	骨髄異形成症候群 5	直腸 5	胎盤 4	その他 18
	50～59	291	乳房 70	結腸 28	卵巣 19	気管支及び肺 17	胃 17	脾 17	甲状腺 16	子宮頸(部) 14	子宮体部 11	直腸 8	食道 7	骨髄性白血病 6	びまん性非ホジキンリンパ腫 6	直腸S状結腸移行部 5	膀胱 5	その他 46
	60～69	694	気管支及び肺 87	乳房 79	結腸 71	胃 66	びまん性非ホジキンリンパ腫 36	卵巣 35	子宮体部 33	脾 27	直腸 27	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞腫瘍 21	ろく濾>胞性非ホジキンリンパ腫 21	呼吸器及び消化器の続発性 20	子宮頸(部) 20	肝及び肝内胆管 20	胆のうく囊> 17	その他 121
	70～79	754	気管支及び肺 133	胃 70	乳房 64	肝及び肝内胆管 52	結腸 52	脾 42	卵巣 36	びまん性非ホジキンリンパ腫 35	その他及び部位不明の胆道 24	子宮体部 24	骨髄異形成症候群 21	甲状腺 20	膀胱 19	直腸 16	骨髄性白血病 15	その他 131
80～89	373	気管支及び肺 60	胃 34	結腸 31	びまん性非ホジキンリンパ腫 31	肝及び肝内胆管 21	脾 20	乳房 18	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞腫瘍 17	その他及び部位不明の胆道 15	膀胱 10	末梢性及び皮膚T細胞リンパ腫 8	皮膚のその他 8	胆のうく囊> 8	直腸 8	子宮体部 7	その他 77	
90歳以上	54	結腸 8	胃 6	骨髄異形成症候群 6	気管支及び肺 5	乳房 4	びまん性非ホジキンリンパ腫 3	直腸 2	外陰(部) 2	直腸S状結腸移行部 2	皮膚のその他 2	その他及び部位不明の胆道 2	末梢性及び皮膚T細胞リンパ腫 2	呼吸器及び消化器の続発性 2	脾 2	卵巣 2	その他 5	