

★倉敷中央病院放射線診断科 紹介RI(一般核医学)検査一覧

部位	検査名	核種	主な目的	備考
脳	脳血流シンチ(IMP)	123I-IMP	脳血流・認知症の診断	検査3日前より1週間ヨウ化カリウム50mg内服が望ましいです。持続動脈採血を原則おこなう必要があります
脳	脳血流シンチ(HMPAO)	99mTc-HMPAO	脳血流・認知症の診断	
脳	脳ダットシンチ(FP-CIT)	123I-FP-CIT	パーキンソン病と本態性振戦の鑑別	薬液に5%エタノールを含みます。別途同意書が必要です
心交感神経	心交感神経シンチ(MIBG)	123I-MIBG	パーキンソン病等の診断	検査3日前より1週間ヨウ化カリウム50mg内服が望ましいです
甲状腺	甲状腺テクネシンチ+摂取率	99mTcO4-	甲状腺機能測定	
甲状腺	甲状腺テクネ+タリウム	99mTcO4-+201Tl	甲状腺結節の形態診断	
副甲状腺	副甲状腺シンチ	99mTc-MIBI	副甲状腺機能亢進症の診断	
副腎	副腎髄質シンチ	123I-MIBG	褐色細胞腫、神経芽細胞腫の診断	検査3日前より1週間ヨウ化カリウム50mg内服が望ましいです。連続して2日間の来院が必要です
肺	肺血流シンチ(+肺換気シンチ)	99mTc-MAA(+81mKr)	肺塞栓症の診断	肺換気シンチを追加可能です
腎	腎静態シンチ	99mTc-DMSA	腎の形態評価・摂取率	
腎	腎動態シンチ+レノグラム	99mTc-DTPA	腎障害・尿路排泄障害の評価	
骨	骨シンチ	99mTc-HMDP	骨転移の診断	体幹部SPECT/CTを追加可能です
その他	ガリウムシンチ	67Ga	腫瘍・炎症の局在診断	注射3日(72時間)後に撮影します。撮影前日に下剤処方下さい
その他	唾液腺シンチ	99mTcO4-	シェーグレン症候群、ワルチン腫瘍の診断	
その他	メッケル憩室シンチ	99mTcO4-	メッケル憩室の存在診断	
その他	消化管出血シンチ	99mTc-HSA-D	消化管出血の部位診断	連続して2日間の来院が必要です

※その他の各種RI検査をご希望の場合、ご連絡ください。

※循環器科系RI検査(心筋シンチなど)につきましては、当院循環器内科にお問い合わせください。