

【臨床腫瘍科】レジメン一覧(2023年3月 時点)

| がん種 | レジメン名 | コース期間 | 薬品 | 基準値 | 投与時間 | Day |
|------------------|---------------------------------------|-------|-----------|------------------------|----------|-------------|
| MSI-Highを有する固形腫瘍 | ベムプロリズマブ | 21 | ベムプロリズマブ | 200 mg | 30分 | 1 |
| MSI-Highを有する固形腫瘍 | ベムプロリズマブ(6週毎) | 42 | ベムプロリズマブ | 400 mg | 30分 | 1 |
| 原発不明癌 | CBDCA①+PTX①⑧⑱(臨床腫瘍科) | 28 | カルボプラチン | 6 AUC | 1時間 | 1 |
| | | | パクリタキセル | 90 mg/m ² | 1時間 | 1,8,15 |
| 原発不明癌 | CPT-11①⑧⑱(臨床腫瘍科) | 28 | イリノテカン | 100 mg/m ² | 90分 | 1,8,15 |
| 原発不明癌 | ニボルマブ | 14 | ニボルマブ | 240 mg | 30分 | 1 |
| 原発不明癌 | ニボルマブ(4週毎) | 28 | ニボルマブ | 480 mg | 30分 | 1 |
| 軟部肉腫(円形細胞肉腫) | CPT-11①⑧+テモゾロミド(臨床腫瘍科) | 21 | テモゾロミド | 100 mg/m ² | | 1,2,3,4,5 |
| | | | イリノテカン | 100 mg/m ² | 90分 | 1,8 |
| 軟部肉腫(円形細胞肉腫) | エリブリン(臨床腫瘍科) | 21 | エリブリン | 1.4 mg/m ² | 5分 | 1,8 |
| 軟部肉腫(円形細胞肉腫) | GEM①⑧+DTX⑧(臨床腫瘍科) | 21 | ゲムシタビン | 1000 mg/m ² | 30分 | 1,8 |
| | | | ドセタキセル | 60 mg/m ² | 1時間 | 8 |
| 軟部肉腫(円形細胞肉腫) | トラベクテジン(臨床腫瘍科) | 21 | トラベクテジン | 1.2 mg/m ² | 24時間 | 1 |
| 軟部肉腫(円形細胞肉腫) | VAC(臨床腫瘍科) | 21 | メスナ | 480 mg/m ² | 15分 | 1 |
| | | | ピンクリスチン | 2 mg/m ² | 5分 | 1 |
| | | | アクチノマイシンD | 1.25 mg/m ² | 5分 | 1 |
| | | | シクロホスファミド | 1200 mg/m ² | 2時間 | 1 |
| 軟部肉腫(円形細胞肉腫) | VDC(臨床腫瘍科) | 21 | メスナ | 480 mg/m ² | 15分 | 1 |
| | | | ピンクリスチン | 2 mg/m ² | 5分 | 1 |
| | | | ドキシソルビシン | 75 mg/m ² | 30分 | 1 |
| | | | シクロホスファミド | 1200 mg/m ² | 2時間 | 1 |
| 軟部肉腫(円形細胞肉腫) | VIDE(臨床腫瘍科) | 21 | メスナ | 1000 mg/m ² | 5分 | 1 |
| | | | メスナ | 3000 mg/m ² | 24時間 | 1 |
| | | | エトポシド | 150 mg/m ² | 1時間 | 1 |
| | | | ピンクリスチン | 1.5 mg/m ² | 5分 | 1 |
| | | | ドキシソルビシン | 20 mg/m ² | 4時間 | 1 |
| | | | イホスファミド | 3 g/m ² | 1時間 | 1 |
| | | | メスナ | 3000 mg/m ² | 24時間 | 2,3 |
| | | | エトポシド | 150 mg/m ² | 1時間 | 2,3 |
| | | | ドキシソルビシン | 20 mg/m ² | 4時間 | 2,3 |
| | | | イホスファミド | 3 g/m ² | 1時間 | 2,3 |
| 軟部肉腫(非円形細胞肉腫) | DXR①(臨床腫瘍科) | 21 | ドキシソルビシン | 75 mg/m ² | 15分 | 1 |
| 軟部肉腫(非円形細胞肉腫) | IFM①②③+DXR①(臨床腫瘍科) | 21 | メスナ | 400 mg/m ² | 5分 | 1 |
| | | | ドキシソルビシン | 50 mg/m ² | 15分 | 1 |
| | | | イホスファミド | 2 g/m ² | 2時間 | 1 |
| | | | メスナ | 400 mg/m ² | 5分 | 2,3 |
| | | | イホスファミド | 2 g/m ² | 2時間 | 2,3 |
| 肉腫 | GEM①⑧+DTX⑧ | 21 | ゲムシタビン | 800 mg/m ² | 30分 | 1,8 |
| | | | ドセタキセル | 70 mg/m ² | 1時間 | 8 |
| 肉腫 | IAP(エビルピシン) | 28 | メスナ | 6 mg/kg | | 1 |
| | | | エビルピシン | 50 mg/m ² | 30分 | 1 |
| | | | シスプラチン | 80 mg/m ² | 1時間 | 1 |
| | | | イホスファミド | 0.03 g/kg | 1時間 | 1 |
| | | | メスナ | 6 mg/kg | | 2,3,4,5 |
| | | | イホスファミド | 0.03 g/kg | 1時間 | 2,3,4,5 |
| 肉腫 | IAP(エビルピシン) short hydration | 28 | メスナ | 6 mg/kg | | 1 |
| | | | エビルピシン | 50 mg/m ² | 30分 | 1 |
| | | | シスプラチン | 80 mg/m ² | 1時間 | 1 |
| | | | イホスファミド | 0.03 g/kg | 1時間 | 1 |
| | | | メスナ | 6 mg/kg | | 2,3,4,5 |
| | | | イホスファミド | 0.03 g/kg | 1時間 | 2,3,4,5 |
| 肉腫 | IT | 21 | メスナ | 320 mg/m ² | 15分 | 1 |
| | | | パクリタキセル | 135 mg/m ² | 3時間 | 1 |
| | | | イホスファミド | 1.6 g/m ² | 2時間 | 1 |
| | | | メスナ | 320 mg/m ² | 15分 | 2,3 |
| | | | イホスファミド | 1.6 g/m ² | 2時間 | 2,3 |
| 肉腫 | VDC-IE | 42 | ピンクリスチン | 1.4 mg/m ² | | 1 |
| | | | メスナ | 240 mg/m ² | 30分 | 1,2 |
| | | | ドキシソルビシン | 25 mg/m ² | 1時間 | 1,2 |
| | | | シクロホスファミド | 600 mg/m ² | 3時間 | 1,2 |
| | | | メスナ | 300 mg/m ² | 30分 | 22,23,24,25 |
| | | | エトポシド | 100 mg/m ² | 1時間 | 22,23,24,25 |
| | | | イホスファミド | 1.5 g/m ² | 3時間 | 22,23,24,25 |
| 肺外原発の小細胞癌、NEC | アムルピシン①②③(臨床腫瘍科) | 21 | アムルピシン | 40 mg/m ² | 5分 | 1,2,3 |
| 肺外原発の小細胞癌、NEC | CBDCA①+CPT-11①⑧⑱(臨床腫瘍科) | 28 | カルボプラチン | 6 AUC | 1時間 | 1 |
| | | | イリノテカン | 60 mg/m ² | 1時間 | 1,8,15 |
| 肺外原発の小細胞癌、NEC | CBDCA①+VP-16①②③(臨床腫瘍科) | 21 | カルボプラチン | 6 AUC | 1時間 | 1 |
| | | | エトポシド | 120 mg/m ² | 1時間 | 1,2,3 |
| 肺外原発の小細胞癌、NEC | CDDP①+CPT-11①⑧⑱(臨床腫瘍科) | 28 | シスプラチン | 60 mg/m ² | 1時間 | 1 |
| | | | イリノテカン | 60 mg/m ² | 1時間 | 1 |
| | | | イリノテカン | 60 mg/m ² | 1時間 | 8,15 |
| 肺外原発の小細胞癌、NEC | CDDP①+CPT-11①⑧⑱short hydration(臨床腫瘍科) | 28 | シスプラチン | 60 mg/m ² | 1時間 | 1 |
| | | | イリノテカン | 60 mg/m ² | 1時間 | 1 |
| | | | イリノテカン | 60 mg/m ² | 1時間 | 8,15 |
| 肺外原発の小細胞癌、NEC | CDDP①+VP-16①②③(臨床腫瘍科) | 21 | エトポシド | 120 mg/m ² | 1時間 | 1 |
| | | | シスプラチン | 80 mg/m ² | 1時間 | 1 |
| | | | エトポシド | 120 mg/m ² | 1時間 | 2,3 |
| 肺外原発の小細胞癌、NEC | CDDP①+VP-16①②③short hydration(臨床腫瘍科) | 21 | エトポシド | 120 mg/m ² | 1時間 | 1 |
| | | | シスプラチン | 80 mg/m ² | 1時間 | 1 |
| | | | エトポシド | 120 mg/m ² | 1時間 | 2,3 |
| 肺外原発の小細胞癌、NEC | CPT-11①⑧⑱(臨床腫瘍科) | 28 | イリノテカン | 100 mg/m ² | 90分 | 1,8,15 |
| 肺外原発の小細胞癌、NEC | ノギテカン①②③④⑤(臨床腫瘍科) | 21 | ノギテカン | 1 mg/m ² | 30分 | 1,2,3,4,5 |
| 肺外原発の小細胞癌、NEC | PTX①⑧⑱(臨床腫瘍科) | 28 | パクリタキセル | 90 mg/m ² | 1時間 | 1,8,15 |
| 肺外原発の小細胞癌、NEC | ストレプトゾシン5日間連日(臨床腫瘍科) | 42 | ストレプトゾシン | 500 mg/m ² | 30分 | 1,2,3,4,5 |
| 肺外原発の小細胞癌、NEC | ストレプトゾシン毎週(臨床腫瘍科) | 7 | ストレプトゾシン | 1000 mg/m ² | 30分 | 1 |
| 有害事象治療 | インフリキシマブ(臨床腫瘍科) | 14 | インフリキシマブ | 5 mg/kg | 10 mL/時間 | 1 |