

【消化器グループ(消化器内科・外科)]レジメン一覧(2022年3月時点)

がん種	レジメン名	コース期間	薬品	基準値	投与時間	Day
MSI-Highを有する固形腫瘍(消)	ベムプロリズマブ	21	ベムプロリズマブ	200 mg	30分	1
MSI-Highを有する固形腫瘍(消)	ベムプロリズマブ(6週毎)	42	ベムプロリズマブ	400 mg	30分	1
胃がん(消)	CDDP+S-1	35	S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-21
胃がん(消)			シスプラチン	60 mg/m ²	2時間	8
胃がん(消)	CPT-11(A法)(胃癌)	35	イリノテカン	100 mg/m ²	90分	1,8,15,22
胃がん(消)	CPT-11(B法)(胃癌)	49	イリノテカン	150 mg/m ²	90分	1,15,29
胃がん(消)	CPT-11+CDDP	28	シスプラチン	30 mg/m ²	2時間	1,15
胃がん(消)			イリノテカン	60 mg/m ²	1時間	1,15
胃がん(消)	ドセタキセル	21	ドセタキセル	60 mg/m ²	1時間	1
胃がん(消)	mFOLFOX6【ポート】(胃癌)	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	mFOLFOX6(アレルギー対策版)【ポート】(胃癌)	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	4時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	Nab-PTX①	21	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260 mg/m ²	30分	1
胃がん(消)	Nab-PTX①⑧⑯	28	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m ²	30分	1,8,15
胃がん(消)	ニボルマブ	14	ニボルマブ	240 mg	30分	1
胃がん(消)	ニボルマブ(4週毎)	28	ニボルマブ	480 mg	30分	1
胃がん(消)	ニボルマブ+SOX	21	オキサリプラチン	100 mg/m ²	2時間	1
			ニボルマブ	360 mg	30分	1
			S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-14
胃がん(消)	ニボルマブ+SOX アレルギー対策版	21	オキサリプラチン	100 mg/m ²	4時間	1
			ニボルマブ	360 mg	30分	1
			S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-14
胃がん(消)	ニボルマブ+mFOLFOX6【ポート】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間	1
			ニボルマブ	240 mg	30分	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	ニボルマブ+mFOLFOX6(アレルギー対策版)【ポート】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	4時間	1
			ニボルマブ	240 mg	30分	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	weeklyPTX	28	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1時間	1,8,15
胃がん(消)	ラムシルマブ	14	ラムシルマブ	8 mg/kg	1時間	1
胃がん(消)	ラムシルマブ+WeeklyPTX	28	ラムシルマブ	8 mg/kg	1時間	1,15
			パクリタキセル注	80 mg/m ²	1時間	1,8,15
胃がん(消)	ラムシルマブ①⑯+Nab-PTX①⑧⑯	28	ラムシルマブ	8 mg/kg	1時間	1,15
胃がん(消)	ラムシルマブ+OPT-11	14	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m ²	30分	1,8,15
胃がん(消)	ラムシルマブ+ロンサーフ	28	ラムシルマブ	8 mg/kg	1時間	1
			イリノテカン	150 mg/m ²	90分	1
			ラムシルマブ	8 mg/kg	1時間	1
			ロンサーフ	70 mg/m ² (体表面積別)		1-5,8-12
胃がん(消)	RPMI【ポート】	56	ラムシルマブ	8 mg/kg	30分	15
			フルオロウラシル	600 mg/m ²	10分	1,8,15,22,29,36
			レボホリナート	250 mg/m ²	2時間	1,8,15,22,29,36
胃がん(消)	SOX(胃癌)	21	オキサリプラチン	100 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	SOX(胃癌) アレルギー対策版	21	オキサリプラチン	100 mg/m ²	4時間	1
			S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-14
			S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-14
胃がん(消)	トラスツズマブ B法 初回	21	トラスツズマブ	8 mg/kg	90分	1
胃がん(消)	トラスツズマブ B法 2回目以降	21	トラスツズマブ	6 mg/kg	30分	1
胃がん(消)	トラスツズマブ デルクステカン(胃がん)	21	トラスツズマブデルクステカン	6.4 mg/kg	90分	1
胃がん(消)	XELOX	21	オキサリプラチン	130 mg/m ²	2時間	1
			カベシタピン錠	2400 mg/m ² (体表面積別)		1-14
胃がん(消)	XELOX(アレルギー対策版)	21	オキサリプラチン	130 mg/m ²	4時間	1
			カベシタピン錠	2400 mg/m ² (体表面積別)		1-14
胃がん(消)	ニボルマブ+XELOX	21	オキサリプラチン	130 mg/m ²	2時間	1
			ニボルマブ	360 mg	30分	1
胃がん(消)	ニボルマブ+XELOX(アレルギー対策版)	21	オキサリプラチン	2400 mg/m ² (体表面積別)	4時間	1
			ニボルマブ	360 mg	30分	1
胃がん(消)	XP	21	カベシタピン錠	2400 mg/m ² (体表面積別)		1-14
			シスプラチン	60 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	mFOLFOX6【末梢】(胃癌)	14	オキサリプラチン	2400 mg/m ² (体表面積別)		1-14
			フルオロウラシル	85 mg/m ²	2時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	mFOLFOX6(アレルギー対策版)【末梢】(胃癌)	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	4時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	RPMI【末梢】	56	フルオロウラシル	600 mg/m ²	10分	1,8,15,22,29,36
			レボホリナート	250 mg/m ²	2時間	1,8,15,22,29,36
胃がん(消)	ニボルマブ+mFOLFOX6【末梢】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間	1
			ニボルマブ	240 mg	30分	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	ニボルマブ+mFOLFOX6(アレルギー対策版)【末梢】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	4時間	1
			ニボルマブ	240 mg	30分	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
肝臓がん	アテゾリズマブ+BEV	21	ベバシズマブ	15 mg/kg	90分	1
			アテゾリズマブ	1200 mg	60分	1
肝臓がん	肝動注(エビルピシン/イオメロン)	1	エビルピシン(肝動注用/イオメロン)	10 mg		1
肝臓がん	肝動注(エビルピシン/イオメロン)【追加用】	1	エビルピシン(肝動注用/イオメロン)	10 mg		1
肝臓がん	肝動注(エビルピシン/イオバミドール)	1	エビルピシン(肝動注用/イオバミドール)	10 mg		1
肝臓がん	肝動注(エビルピシン/イオバミドール)【追加用】	1	エビルピシン(肝動注用/イオバミドール)	10 mg		1
肝臓がん	肝動注(エビルピシン/オブチレイ)	1	エビルピシン(肝動注用/オブチレイ)	10 mg		1
肝臓がん	肝動注(エビルピシン/オブチレイ)【追加用】	1	エビルピシン(肝動注用/オブチレイ)	10 mg		1
肝臓がん	肝動注(エビルピシン/DCビーズ)	1	エビルピシン	50 mg		1
肝臓がん	肝動注(エビルピシン/DCビーズ)【追加用】	1	エビルピシン	50 mg		1
肝臓がん	肝動注(アイエーコール)	1	動注用アイエーコール	100 mg		1
肝臓がん	肝動注(アイエーコール)【追加用】	1	動注用アイエーコール	100 mg		1
肝臓がん	RAM	14	ラムシルマブ	8 mg/kg	1時間	1
結腸・直腸がん(消)	XELOX	21	オキサリプラチン	130 mg/m ²	2時間	1
結腸・直腸がん(消)	XELOX(アレルギー対策版)	21	オキサリプラチン	2400 mg/m ² (体表面積別)		1-14
			カベシタピン錠	130 mg/m ²	4時間	1
結腸・直腸がん(消)	アフリベルセプト+FOLFIRI 【ポート】	14	オキサリプラチン	2400 mg/m ² (体表面積別)		1-14
			アフリベルセプト	4 mg/kg	1時間	1
			イリノテカン	150 mg/m ²	2時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+FOLFIRI 【ポート】	14	ベバシズマブ	5 mg/kg	90分	1
			イリノテカン	150 mg/m ²	2時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1

結腸・直腸がん(消)	BEV+IRIS(4週毎)	28	フルオロウラシル レボホリナート ペバシズマブ イリノテカン S-1	400 mg/m ² 200 mg/m ² 5 mg/kg 100 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	10分 2時間 90分 90分	1 1 1,15 1-14
結腸・直腸がん(消)	BEV+IRIS(3週毎)	21	ペバシズマブ レボホリナート イリノテカン S-1	5 mg/kg 7.5 mg/kg 150 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	60分 90分 90分	15 1 1-14
結腸・直腸がん(消)	BEV+mFOLFOX6 【ポート】	14	ペバシズマブ オキサリプラチン フルオロウラシル レボホリナート	5 mg/kg 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	90分 2時間 46時間 2時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	BEV+mFOLFOX6 アレルギー対策版 【ポート】	14	ペバシズマブ オキサリプラチン フルオロウラシル レボホリナート	5 mg/kg 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	90分 4時間 46時間 2時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	BEV+sLV5FU2 【ポート】	14	ペバシズマブ フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	5 mg/kg 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	90分 46時間 10分 2時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	BEV+SOX	21	ペバシズマブ オキサリプラチン S-1	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	90分 2時間	1 1-14
結腸・直腸がん(消)	BEV+SOX アレルギー対策版	21	ペバシズマブ オキサリプラチン S-1	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	90分 4時間	1 1-14
結腸・直腸がん(消)	BEV+XELOX	21	ペバシズマブ オキサリプラチン カベシタピン錠	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 2400 mg/m ² (体表面積別)	90分 2時間	1 1-14
結腸・直腸がん(消)	BEV+XELOX アレルギー対策版	21	ペバシズマブ オキサリプラチン カベシタピン錠	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 2400 mg/m ² (体表面積別)	90分 4時間	1 1-14
結腸・直腸がん(消)	BEV+FOLFOXIRI 【ポート】	14	ペバシズマブ オキサリプラチン イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート	5 mg/kg 85 mg/m ² 165 mg/m ² 3200 mg/m ² 200 mg/m ²	90分 2時間 1時間 48時間 2時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	BEV+FOLFOXIRI(アレルギー対策版) 【ポート】	14	ペバシズマブ オキサリプラチン イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート	5 mg/kg 85 mg/m ² 165 mg/m ² 3200 mg/m ² 200 mg/m ²	90分 4時間 1時間 48時間 2時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	BEV+ロンサーフ	28	ペバシズマブ ロンサーフ	5 mg/kg 70 mg/m ² (体表面積別)	90分	1 1-5,8-12
結腸・直腸がん(消)	CPT-11 (A法)(結腸・直腸がん)	35	イリノテカン	100 mg/m ²	60分	15
結腸・直腸がん(消)	CPT-11 (B法)(結腸・直腸がん)	49	イリノテカン	150 mg/m ²	90分	1,8,15,22
結腸・直腸がん(消)	FOLFIRI 【ポート】	14	イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	150 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	2時間 46時間 10分 2時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOXIRI 【ポート】	14	オキサリプラチン イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	2時間 1時間 48時間 2時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOXIRI 【末梢】	14	オキサリプラチン イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	2時間 1時間 48時間 2時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOXIRI(アレルギー対策版) 【ポート】	14	オキサリプラチン イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	4時間 1時間 48時間 2時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOXIRI(アレルギー対策版) 【末梢】	14	オキサリプラチン イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	4時間 1時間 48時間 2時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	IRIS	28	フルオロウラシル レボホリナート イリノテカン S-1	2400 mg/m ² 200 mg/m ² 125 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	48時間 2時間 90分	1,15 1 1-14
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOX6 【ポート】	14	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	2時間 46時間 10分 2時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOX6(アレルギー対策版) 【ポート】	14	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	4時間 46時間 10分 2時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	ニボルマブ (大腸癌)	14	ニボルマブ	240 mg	30分	1
結腸・直腸がん(消)	ニボルマブ (大腸癌) 【4週毎】	28	ニボルマブ	480 mg	30分	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+CPT11	14	イリノテカン パニツムマブ	150 mg/m ² 6 mg/kg	90分 1時間	1 1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+FOLFIRI 【ポート】	14	イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル パニツムマブ レボホリナート	150 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 6 mg/kg 200 mg/m ²	2時間 46時間 10分 1時間 2時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+mFOLFOX6 【ポート】	14	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル パニツムマブ レボホリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 6 mg/kg 200 mg/m ²	2時間 46時間 10分 1時間 2時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+mFOLFOX6 (アレルギー対策版) 【ポート】	14	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル パニツムマブ レボホリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 6 mg/kg 200 mg/m ²	2時間 46時間 10分 1時間 2時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ単独	14	パニツムマブ	6 mg/kg	1時間	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+IRIS	28	パニツムマブ イリノテカン パニツムマブ S-1	6 mg/kg 100 mg/m ² 6 mg/kg 80 mg/m ² (体表面積別)	1時間 90分 1時間	1,15 1 1-14
結腸・直腸がん(消)	ラムシルマブ+FOLFIRI 【ポート】	14	ラムシルマブ イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	8 mg/kg 150 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	1時間 2時間 46時間 10分 2時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ 初回	7	セツキシマブ	400 mg/m ²	2時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ 2回目以降	7	セツキシマブ	250 mg/m ²	1時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+CPT11 初回	14	セツキシマブ イリノテカン セツキシマブ	400 mg/m ² 150 mg/m ² 250 mg/m ²	2時間 90分 1時間	1 1,15 8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+CPT11 (2コース目以降)	14	イリノテカン セツキシマブ	150 mg/m ² 250 mg/m ²	90分 1時間	1 ,8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI 初回 【ポート】	14	セツキシマブ フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン	400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 150 mg/m ²	2時間 2時間 2時間	1 1 1

結腸・直腸がん(消)	FOLFIRI【末梢】	14	レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル	200 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ²	2 時間 2 時間 46 時間	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOX6【末梢】	14	フルオロウラシル レボホリナート オキサリプラチン	400 mg/m ² 200 mg/m ² 85 mg/m ²	10 分 2 時間 2 時間	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOX6(アレルギー対策版)【末梢】	14	フルオロウラシル レボホリナート オキサリプラチン	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 85 mg/m ²	46 時間 10 分 4 時間	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+FOLFIRI【末梢】	14	フルオロウラシル レボホリナート イリノテカン	2400 mg/m ² 200 mg/m ² 150 mg/m ²	46 時間 2 時間 2 時間	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+mFOLFOX6【末梢】	14	フルオロウラシル レボホリナート オキサリプラチン	400 mg/m ² 200 mg/m ² 85 mg/m ²	10 分 2 時間 2 時間	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+mFOLFOX6(アレルギー対策版)【末梢】	14	フルオロウラシル レボホリナート オキサリプラチン	400 mg/m ² 200 mg/m ² 85 mg/m ²	10 分 2 時間 4 時間	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	ラムシルマブ+FOLFIRI【末梢】	14	フルオロウラシル レボホリナート ラムシルマブ	2400 mg/m ² 200 mg/m ² 8 mg/kg	46 時間 2 時間 1 時間	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI 初回【末梢】	14	フルオロウラシル レボホリナート セツキシマブ	400 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ²	10 分 2 時間 2 時間	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI(2コース目以降)【末梢】	14	フルオロウラシル レボホリナート セツキシマブ	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 250 mg/m ²	46 時間 10 分 1 時間	1 1 8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 初回【末梢】	14	フルオロウラシル レボホリナート セツキシマブ	400 mg/m ² 200 mg/m ² 250 mg/m ²	10 分 2 時間 1 時間	1 1 8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6(2コース目以降)【末梢】	14	フルオロウラシル レボホリナート セツキシマブ	400 mg/m ² 200 mg/m ² 250 mg/m ²	10 分 2 時間 1 時間	1 1 8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 初回 アレルギー対策版【末梢】	14	フルオロウラシル レボホリナート セツキシマブ	400 mg/m ² 200 mg/m ² 250 mg/m ²	10 分 2 時間 1 時間	1 1 8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6(2コース目以降)アレルギー対策版【末梢】	14	フルオロウラシル レボホリナート セツキシマブ	400 mg/m ² 200 mg/m ² 250 mg/m ²	10 分 2 時間 1 時間	1 1 8
結腸・直腸がん(消)	sLV5FU2【末梢】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル セツキシマブ	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 250 mg/m ²	46 時間 10 分 1 時間	1 1 8
食道がん(消)	DCF(ドセタキセル, 5FU, CDDP併用)	21	フルオロウラシル レボホリナート シスプラチン	400 mg/m ² 200 mg/m ² 60 mg/m ²	2 時間 2 時間 1 時間	1 1 1
食道がん(消)	DCF(ドセタキセル分割)	28	フルオロウラシル シスプラチン ドセタキセル	600 mg/m ² 80 mg/m ² 30 mg/m ²	24 時間 2 時間 1 時間	1,2,3,4,5 1 1
食道がん(消)	ドセタキセル	21	フルオロウラシル ドセタキセル	800 mg/m ² 30 mg/m ²	24 時間 1 時間	1,2,3,4,5 15
食道がん(消)	ドセタキセル+ネダプラチン	14	フルオロウラシル ネダプラチン	40 mg/m ² 30 mg/m ²	1 時間 1 時間	1 1
食道がん(消)	FP(5FU 1000/CDDP 75)+RT(50.4Gy) RTOG	56	フルオロウラシル シスプラチン	1000 mg/m ² 75 mg/m ²	24 時間 2 時間	1-4,29-32 1,29
食道がん(消)	FP(5FU 400/CDDP 40)+RT	35	フルオロウラシル シスプラチン	400 mg/m ² 40 mg/m ²	24 時間 2 時間	1-5,8,-12 1,8
食道がん(消)	FP(5FU 700/CDDP 70)+RT(60Gy)	56	フルオロウラシル シスプラチン	700 mg/m ² 70 mg/m ²	24 時間 2 時間	1-4,29,-32 1,29
食道がん(消)	FP(5FU 800/CDDP 80)	28	フルオロウラシル シスプラチン	80 mg/m ² 80 mg/m ²	2 時間 2 時間	1 1-5
食道がん(消)	5FU+ネダプラチン	28	フルオロウラシル ネダプラチン	90 mg/m ² 800 mg/m ²	2 時間 24 時間	1-5,8,-12 1-5
食道がん(消)	mFOLFOX6【ポート】(食道癌)	14	フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ²	2 時間 46 時間 10 分	1 1 1
食道がん(消)	mFOLFOX6(アレルギー対策版)【ポート】(食道癌)	14	フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	200 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ²	2 時間 46 時間 10 分	1 1 1
食道がん(消)	mFOLFOX6【末梢】(食道癌)	14	フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	200 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ²	2 時間 46 時間 10 分	1 1 1
食道がん(消)	mFOLFOX6(アレルギー対策版)【末梢】(食道癌)	14	フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	200 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ²	2 時間 46 時間 10 分	1 1 1
食道がん(消)	NAC DNF	21	フルオロウラシル ネダプラチン ドセタキセル	400 mg/m ² 50 mg/m ² 30 mg/m ²	24 時間 1 時間 1 時間	1-5,8,-12 1,8 1,8
食道がん(消)	ニボルマブ(食道癌)	14	ニボルマブ	240 mg	30 分	1
食道がん(消)	ニボルマブ(食道癌)【4週毎】	28	ニボルマブ	480 mg	30 分	1
食道がん(消)	ペムブロリズマブ+FP(5FU 800/CDDP 80)	21	ペムブロリズマブ シスプラチン	200 mg 80 mg/m ²	30 分 2 時間	1 1
食道がん(消)	ペムブロリズマブ+5-FU	21	フルオロウラシル ペムブロリズマブ	800 mg/m ² 200 mg	24 時間 30 分	1-5 1
食道がん(消)	weeklyPTX	56	フルオロウラシル パクリタキセル注	800 mg/m ² 100 mg/m ²	24 時間 1 時間	1,2,3,4,5 1,8,15,22,29,36
食道がん(消)	UDON	28	ネダプラチン	90 mg/m ²	1 時間	1

			ドセタキセル	35 mg/m ²	1 時間	1
			フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,5
			ドセタキセル	35 mg/m ²	1 時間	15
肛門管癌	CBDCA①+PTX①⑧⑮	28	カルボプラチン	5 AUC	1 時間	1
			パクリタキセル注	80 mg/m ²	1 時間	1,8,15
肛門管癌	FP (5FU 1000/CDDP 60)	21	シスプラチン	60 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	1000 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4
肛門管癌	FP (5FU 1000/CDDP 75) + RT	56	フルオロウラシル	1000 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,29,30,31,32
			シスプラチン	75 mg/m ²	2 時間	1,29
膵臓・胆道癌(消)	GS療法【低用量 (S-1 : 60mg/m ²) レジメン】	21	S-1	60 mg/m ² (体表面積別)	30 分	1-14
			ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1,8
膵臓・胆道癌(消)	GS療法【通常量 (S-1 : 80mg/m ²) レジメン】	21	S-1	80 mg/m ² (体表面積別)	30 分	1-14
			ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1,8
膵臓・胆道癌(消)	CDDP①⑧+GEM①⑧	21	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1,8
			シスプラチン	25 mg/m ²	1 時間	1,8
膵臓・胆道癌(消)	CDDP①⑧+GEM①⑧ short hydration	21	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1,8
			シスプラチン	25 mg/m ²	1 時間	1,8
膵臓・胆道癌(消)	FOLFIRINOX【ポート】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
			イリノテカン	180 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	FOLFIRINOX【末梢】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
			イリノテカン	180 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
膵臓・胆道癌(消)	mFOLFIRINOX【ポート】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
			イリノテカン	150 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	mFOLFIRINOX【末梢】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
			イリノテカン	150 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	FOLFIRINOX (アレルギー対策版)【ポート】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
			イリノテカン	180 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
膵臓・胆道癌(消)	FOLFIRINOX (アレルギー対策版)【末梢】	14	オキサリプラチン	200 mg/m ²	2 時間	1
			イリノテカン	180 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
膵臓・胆道癌(消)	mFOLFIRINOX (アレルギー対策版)【ポート】	14	オキサリプラチン	200 mg/m ²	2 時間	1
			イリノテカン	150 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	mFOLFIRINOX (アレルギー対策版)【末梢】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
			イリノテカン	150 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	GCS short hydration	14	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1
			シスプラチン	25 mg/m ²	1 時間	1
			S-1	80 mg/m ² (体表面積別)	30 分	1-7
膵臓・胆道癌(消)	GEM	28	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1,8,15
膵臓・胆道癌(消)	nab-PTX①⑧⑮+GEM①⑧⑮	28	アルブミン懸濁型パクリタキセル	125 mg/m ²	30 分	1,8,15
			ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1,8,15
膵臓・胆道癌(消)	nal-IRI+LV/5FU【ポート】	14	イリノテカン塩酸水和物	70 mg/m ²	90 分	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	nal-IRI+LV/5FU【末梢】	14	イリノテカン塩酸水和物	70 mg/m ²	90 分	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1