

【消化器グループ(消化器内科・外科)】レジメン一覧(2023年3月時点)

がん種	レジメン名	コース期間	薬品	基準値	投与時間	Day
MST-Highを有する固形腫瘍(消)	ベムプロリスマブ	21	ベムプロリスマブ	200 mg	30分	1
MST-Highを有する固形腫瘍(消)	ベムプロリスマブ(6週毎)	42	ベムプロリスマブ	400 mg	30分	1
胃がん(消)	CDDP+S-1	35	S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-21
胃がん(消)			シスプラチン	60 mg/m ²	2時間	8
胃がん(消)	CPT-11(A法)(胃癌)	35	イリノテカン	100 mg/m ²	90分	1,8,15,22
胃がん(消)	CPT-11(B法)(胃癌)	49	イリノテカン	150 mg/m ²	90分	1,15,29
胃がん(消)	CPT-11+CDDP	28	シスプラチン	30 mg/m ²	2時間	1,15
胃がん(消)			イリノテカン	60 mg/m ²	1時間	1,15
胃がん(消)	ドセタキセル	21	ドセタキセル	60 mg/m ²	1時間	1
胃がん(消)	mFOLFOX6【ポート】(胃癌)	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
胃がん(消)			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	mFOLFOX6(アレルギー対策版)【ポート】(胃癌)	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	4時間	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
胃がん(消)			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	Nab-PTX①	21	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260 mg/m ²	30分	1
胃がん(消)	Nab-PTX①⑧⑯	28	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m ²	30分	1,8,15
胃がん(消)	ニボルマブ	14	ニボルマブ	240 mg	30分	1
胃がん(消)	ニボルマブ(4週毎)	28	ニボルマブ	480 mg	30分	1
胃がん(消)	ニボルマブ+SOX	21	オキサリプラチン	100 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)			ニボルマブ	360 mg	30分	1
胃がん(消)			S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-14
胃がん(消)	ニボルマブ+SOX アレルギー対策版	21	オキサリプラチン	100 mg/m ²	4時間	1
胃がん(消)			ニボルマブ	360 mg	30分	1
胃がん(消)			S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-14
胃がん(消)	ニボルマブ+mFOLFOX6【ポート】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)			ニボルマブ	240 mg	30分	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
胃がん(消)			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	ニボルマブ+mFOLFOX6(アレルギー対策版)【ポート】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	4時間	1
胃がん(消)			ニボルマブ	240 mg	30分	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
胃がん(消)			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	weeklyPTX	28	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1時間	1,8,15
胃がん(消)	ラムシルマブ	14	ラムシルマブ	8 mg/kg	1時間	1
胃がん(消)	ラムシルマブ+WeeklyPTX	28	ラムシルマブ	8 mg/kg	1時間	1,15
胃がん(消)			パクリタキセル注	80 mg/m ²	1時間	1,8,15
胃がん(消)	ラムシルマブ①⑯+Nab-PTX①⑧⑯	28	ラムシルマブ	8 mg/kg	1時間	1,15
胃がん(消)			アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m ²	30分	1,8,15
胃がん(消)	ラムシルマブ+CPT-11	14	ラムシルマブ	8 mg/kg	1時間	1
胃がん(消)			イリノテカン	150 mg/m ²	90分	1
胃がん(消)	ラムシルマブ+ロンサーフ	28	ラムシルマブ	8 mg/kg	1時間	1
胃がん(消)			ロンサーフ	70 mg/m ² (体表面積別)		1-5,8-12
胃がん(消)			ラムシルマブ	8 mg/kg	30分	15
胃がん(消)	RPMI【ポート】	56	フルオロウラシル	600 mg/m ²	10分	1,8,15,22,29,36
胃がん(消)			レボホリナート	250 mg/m ²	2時間	1,8,15,22,29,36
胃がん(消)	SOX(胃癌)	21	オキサリプラチン	100 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)			S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-14
胃がん(消)	SOX(胃癌) アレルギー対策版	21	オキサリプラチン	100 mg/m ²	4時間	1
胃がん(消)			S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-14
胃がん(消)	トラスツズマブ B法 初回	21	トラスツズマブ	8 mg/kg	90分	1
胃がん(消)	トラスツズマブ B法 2回目以降	21	トラスツズマブ	6 mg/kg	30分	1
胃がん(消)	トラスツズマブ デルクステカン(胃がん)	21	トラスツズマブ	6.4 mg/kg	90分	1
胃がん(消)	XELOX	21	オキサリプラチン	130 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)			カベシタビン錠	2400 mg/m ² (体表面積別)		1-14
胃がん(消)	XELOX(アレルギー対策版)	21	オキサリプラチン	130 mg/m ²	4時間	1
胃がん(消)			カベシタビン錠	2400 mg/m ² (体表面積別)		1-14
胃がん(消)	ニボルマブ+XELOX	21	オキサリプラチン	130 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)			ニボルマブ	360 mg	30分	1
胃がん(消)	ニボルマブ+XELOX(アレルギー対策版)	21	オキサリプラチン	2400 mg/m ² (体表面積別)	4時間	1
胃がん(消)			ニボルマブ	130 mg/m ²	30分	1
胃がん(消)			カベシタビン錠	2400 mg/m ² (体表面積別)		1-14
胃がん(消)	XP	21	シスプラチン	60 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)			カベシタビン錠	2400 mg/m ² (体表面積別)		1-14
胃がん(消)	mFOLFOX6【末梢】(胃癌)	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
胃がん(消)			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	mFOLFOX6(アレルギー対策版)【末梢】(胃癌)	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	4時間	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
胃がん(消)			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	RPMI【末梢】	56	フルオロウラシル	600 mg/m ²	10分	1,8,15,22,29,36
胃がん(消)			レボホリナート	250 mg/m ²	2時間	1,8,15,22,29,36
胃がん(消)	ニボルマブ+mFOLFOX6【末梢】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)			ニボルマブ	240 mg	30分	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
胃がん(消)			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
胃がん(消)	ニボルマブ+mFOLFOX6(アレルギー対策版)【末梢】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	4時間	1
胃がん(消)			ニボルマブ	240 mg	30分	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
胃がん(消)			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
胃がん(消)			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
肝臓がん	アテゾリズマブ+BEV	21	アテゾリズマブ	1200 mg	90分	1
肝臓がん			ベバシズマブ	15 mg/kg	2時間	1
肝臓がん			エビルビン(肝動注用/イオメロン)	10 mg	60分	1
肝臓がん	肝動注(エビルビン/イオメロン)	1	エビルビン(肝動注用/イオメロン)	10 mg	1	1
肝臓がん	肝動注(エビルビン/イオメロン)【追加用】	1	エビルビン(肝動注用/イオメロン)	10 mg	1	1
肝臓がん	肝動注(エビルビン/イオパミドール)【追加用】	1	エビルビン(肝動注用/イオパミドール)	10 mg	1	1
肝臓がん	肝動注(エビルビン/イオパミドール)【追加用】	1	エビルビン(肝動注用/イオパミドール)	10 mg	1	1
肝臓がん	肝動注(エビルビン/オブチレイ)	1	エビルビン(肝動注用/オブチレイ)	10 mg	1	1
肝臓がん	肝動注(エビルビン/オブチレイ)【追加用】	1	エビルビン(肝動注用/オブチレイ)	10 mg	1	1
肝臓がん	肝動注(エビルビン/DCビーズ)	1	エビルビン	50 mg	1	1
肝臓がん	肝動注(エビルビン/DCビーズ)【追加用】	1	エビルビン	50 mg	1	1
肝臓がん	肝動注(アイエーコール)	1	動注用アイエーコール	100 mg	1	1
肝臓がん	肝動注(アイエーコール)【追加用】	1	動注用アイエーコール	100 mg	1	1
肝臓がん	RAM	14	ラムシルマブ	8 mg/kg	1時間	1
結腸・直腸がん(消)	XELOX	21	オキサリプラチン	130 mg/m ²	2時間	1
結腸・直腸がん(消)			カベシタビン錠	2400 mg/m ² (体表面積別)		1-14
結腸・直腸がん(消)	XELOX(アレルギー対策版)	21	オキサリプラチン	130 mg/m ²	4時間	1
結腸・直腸がん(消)			カベシタビン錠	2400 mg/m ² (体表面積別)		1-14
結腸・直腸がん(消)	アフリベルセプト+FOLFIRI 【ポート】	14	アフリベルセプト	4 mg/kg	1時間	1
結腸・直腸がん(消)			イリノテカン	150 mg/m ²	2時間	1
結腸・直腸がん(消)			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
結腸・直腸がん(消)			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
結腸・直腸がん(消)			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+FOLFIRI 【ポート】	14	ベバシズマブ	5 mg/kg	90分	1
結腸・直腸がん(消)			イリノテカン	150 mg/m ²	2時間	1
結腸・直腸がん(消)			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46時間	1
結腸・直腸がん(消)			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10分	1
結腸・直腸がん(消)			レボホリナート	200 mg/m ²	2時間	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+IRIS(4週毎)	28	ベバシズマブ	5 mg/kg	90分	1
結腸・直腸がん(消)			イリノテカン	100 mg/m ²	90分	1,15
結腸・直腸がん(消)			S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-14
結腸・直腸がん(消)			ベバシズマブ	5 mg/kg	60分	15
結腸・直腸がん(消)	BEV+IRIS(3週毎)	21	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	90分	1

				イリノチカン	150 mg/m ²	90 分	1
				S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-14
結腸・直腸がん(消)	BEV+mFOLFOX6【ポート】	14		ペバシズマブ	5 mg/kg	90 分	1
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+mFOLFOX6 アレルギ対策版【ポート】	14		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				ペバシズマブ	5 mg/kg	90 分	1
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+sLV5FU2【ポート】	14		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				ペバシズマブ	5 mg/kg	90 分	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+SOX	21		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				ペバシズマブ	7.5 mg/kg	90 分	1
				オキサリプラチン	130 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+SOX アレルギ対策版	21		S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-14
				ペバシズマブ	7.5 mg/kg	90 分	1
				オキサリプラチン	130 mg/m ²	4 時間	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+XELOX	21		S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-14
				ペバシズマブ	7.5 mg/kg	90 分	1
				オキサリプラチン	130 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+XELOX アレルギ対策版	21		カベシタピン錠	2400 mg/m ² (体表面積別)		1-14
				ペバシズマブ	7.5 mg/kg	90 分	1
				オキサリプラチン	130 mg/m ²	4 時間	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+FOLFOXIRI【ポート】	14		ペバシズマブ	2400 mg/m ² (体表面積別)		1-14
				オキサリプラチン	5 mg/kg	90 分	1
				イリノチカン	85 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	165 mg/m ²	1 時間	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+FOLFOXIRI(アレルギ対策版)【ポート】	14		フルオロウラシル	3200 mg/m ²	48 時間	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				ペバシズマブ	5 mg/kg	90 分	1
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
				イリノチカン	165 mg/m ²	1 時間	1
				フルオロウラシル	3200 mg/m ²	48 時間	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+ロンサーフ	28		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				ペバシズマブ	5 mg/kg	90 分	1
				ロンサーフ	70 mg/m ² (体表面積別)		1-5,8-12
				ペバシズマブ	5 mg/kg	60 分	15
結腸・直腸がん(消)	CPT-11(A法)(結腸・直腸がん)	35		イリノチカン	100 mg/m ²	90 分	1,8,15,22
結腸・直腸がん(消)	CPT-11(B法)(結腸・直腸がん)	49		イリノチカン	150 mg/m ²	90 分	1,15,29
結腸・直腸がん(消)	FOLFIRI【ポート】	14		イリノチカン	150 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOXIRI【ポート】	14		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
				イリノチカン	150 mg/m ²	1 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	48 時間	1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOXIRI【末梢】	14		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
				イリノチカン	150 mg/m ²	1 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	48 時間	1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOXIRI(アレルギ対策版)【ポート】	14		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
				イリノチカン	150 mg/m ²	1 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	48 時間	1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOXIRI(アレルギ対策版)【末梢】	14		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
				イリノチカン	150 mg/m ²	1 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	48 時間	1
結腸・直腸がん(消)	IRIS	28		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				イリノチカン	125 mg/m ²	90 分	1,15
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOX6【ポート】	14		S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-14
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOX6(アレルギ対策版)【ポート】	14		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
結腸・直腸がん(消)	ニボルマブ(大腸癌)	14		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	ニボルマブ(大腸癌)【4週毎】	28		ニボルマブ	240 mg	30 分	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+CPT11	14		ニボルマブ	480 mg	30 分	1
				イリノチカン	150 mg/m ²	90 分	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+FOLFIRI【ポート】	14		パニツムマブ	6 mg/kg	1 時間	1
				イリノチカン	150 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+mFOLFOX6【ポート】	14		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				パニツムマブ	6 mg/kg	1 時間	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+mFOLFOX6(アレルギ対策版)【ポート】	14		オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				パニツムマブ	6 mg/kg	1 時間	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ単独	14		パニツムマブ	6 mg/kg	1 時間	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+IRIS	28		イリノチカン	100 mg/m ²	90 分	1,15
				パニツムマブ	6 mg/kg	1 時間	1,15
結腸・直腸がん(消)	triweekly ヘルツスマブ+トラスツズマブ(初回)	21		S-1	80 mg/m ² (体表面積別)		1-14
				トラスツズマブ	8 mg/kg	90 分	1
				ヘルツスマブ	840 mg	1 時間	1
結腸・直腸がん(消)	triweekly ヘルツスマブ+トラスツズマブ(2回目以降)	21		トラスツズマブ	6 mg/kg	30 分	1
				ヘルツスマブ	420 mg	30 分	1
結腸・直腸がん(消)	ラムシルマブ+FOLFIRI【ポート】	14		ラムシルマブ	8 mg/kg	1 時間	1
				イリノチカン	150 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ 初回	7		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ 2回目以降	7		セツキシマブ	400 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ(biweekly)	14		セツキシマブ	250 mg/m ²	1 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+CPT11 初回	14		セツキシマブ	500 mg/m ²	120 分	1
				セツキシマブ	400 mg/m ²	2 時間	1
				イリノチカン	150 mg/m ²	90 分	1
				セツキシマブ	250 mg/m ²	1 時間	8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+CPT11(2コース目以降)	14		セツキシマブ	150 mg/m ²	90 分	1
				イリノチカン	150 mg/m ²	1 時間	1,8
				セツキシマブ	250 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI 初回【ポート】	14		セツキシマブ	400 mg/m ²	2 時間	1
				イリノチカン	150 mg/m ²	1 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				セツキシマブ	250 mg/m ²	1 時間	8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI(2コース目以降)【ポート】	14		イリノチカン	150 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				セツキシマブ	250 mg/m ²	1 時間	8
				イリノチカン	150 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				セツキシマブ	250 mg/m ²	1 時間	1,8

結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 初回【ポート】	14	セツキシマブ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート セツキシマブ	400 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ² 250 mg/m ²	2 時間 2 時間 46 時間 10 分 2 時間 1 時間	1 1 1 1 1 8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6(2コース目以降)【ポート】	14	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート セツキシマブ	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ² 250 mg/m ²	2 時間 46 時間 10 分 2 時間 1 時間	1 1 1 1 8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 初回 アレルギー対策版【ポート】	14	セツキシマブ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート セツキシマブ	400 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ² 250 mg/m ²	2 時間 4 時間 46 時間 10 分 2 時間 1 時間	1 1 1 1 1 1.8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6(2コース目以降)アレルギー対策版【ポート】	14	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート セツキシマブ	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ² 250 mg/m ²	4 時間 46 時間 10 分 2 時間 1 時間	1 1 1 8 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+SOX 初回	21	セツキシマブ オキサリプラチン オキサリプラチン S-1	250 mg/m ² 130 mg/m ² 130 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	1 時間 2 時間 2 時間 1-14	8.15 1 1 1-14
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+SOX (2コース目以降)	21	セツキシマブ オキサリプラチン S-1	250 mg/m ² 130 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	1 時間 2 時間 1-14	8.15 1 1-14
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+SOX 初回 アレルギー対策版	21	セツキシマブ オキサリプラチン オキサリプラチン S-1	250 mg/m ² 400 mg/m ² 130 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	1 時間 2 時間 4 時間 1-14	1.8,15 1 1 1-14
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+SOX (2コース目以降)アレルギー対策版	21	セツキシマブ オキサリプラチン S-1	250 mg/m ² 130 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	1 時間 4 時間 1-14	8.15 1 1-14
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI (biweekly)【ポート】	14	セツキシマブ セツキシマブ イリノチカン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	500 mg/m ² 500 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	120 分 2 時間 2 時間 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI (biweekly)【末梢】	14	セツキシマブ イリノチカン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	500 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	120 分 2 時間 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 (biweekly)【ポート】	14	セツキシマブ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	500 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	120 分 2 時間 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 (biweekly)【末梢】	14	セツキシマブ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	500 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	120 分 2 時間 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 (biweekly) アレルギー対策版【ポート】	14	セツキシマブ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	500 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	120 分 4 時間 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 (biweekly) アレルギー対策版【末梢】	14	セツキシマブ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	500 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	120 分 4 時間 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ (初回)	7	セツキシマブ	400 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ (2回目以降)	7	セツキシマブ	250 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ (biweekly)	14	セツキシマブ	500 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	sLV5FU2【ポート】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	46 時間 10 分 2 時間	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	SOX(結腸・直腸がん)	21	オキサリプラチン S-1	130 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	2 時間 1-14	1 1-14
結腸・直腸がん(消)	SOX(結腸・直腸がん) アレルギー対策版	21	オキサリプラチン S-1	130 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	4 時間 1-14	1 1-14
結腸・直腸がん(消)	アフリベルセプト+FOLFIRI【末梢】	14	アフリベルセプト イリノチカン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	4 mg/kg 150 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	1 時間 2 時間 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	BEV+FOLFIRI【末梢】	14	ベバシズマブ イリノチカン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	5 mg/kg 150 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	90 分 2 時間 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	BEV+mFOLFOX6【末梢】	14	ベバシズマブ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	5 mg/kg 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	90 分 2 時間 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	BEV+mFOLFOX6 アレルギー対策版【末梢】	14	ベバシズマブ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	5 mg/kg 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	90 分 4 時間 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	BEV+sLV5FU2【末梢】	14	ベバシズマブ フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	5 mg/kg 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	90 分 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	BEV+FOLFOXIRI【末梢】	14	ベバシズマブ オキサリプラチン イリノチカン フルオロウラシル レボホリナート	5 mg/kg 85 mg/m ² 165 mg/m ² 3200 mg/m ² 200 mg/m ²	90 分 2 時間 1 時間 48 時間 2 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	BEV+FOLFOXIRI(アレルギー対策版)【末梢】	14	ベバシズマブ オキサリプラチン イリノチカン フルオロウラシル レボホリナート	5 mg/kg 85 mg/m ² 165 mg/m ² 3200 mg/m ² 200 mg/m ²	90 分 4 時間 1 時間 48 時間 2 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	FOLFIRI【末梢】	14	イリノチカン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	150 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	2 時間 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOX6【末梢】	14	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	2 時間 46 時間 10 分 2 時間 2 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOX6(アレルギー対策版)【末梢】	14	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	4 時間 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+FOLFIRI【末梢】	14	イリノチカン フルオロウラシル	150 mg/m ² 2400 mg/m ²	2 時間 46 時間	1 1

				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				パニツムマブ	6 mg/kg	1 時間	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+mFOLFOX6【末梢】	14		オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				パニツムマブ	6 mg/kg	1 時間	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+mFOLFOX6 (アレルギー対策版)【末梢】	14		オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				パニツムマブ	6 mg/kg	1 時間	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	ラムシルマブ+FOLFIRI【末梢】	14		ラムシルマブ	8 mg/kg	1 時間	1
				イリノテカン	150 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI 初回【末梢】	14		セツキシマブ	400 mg/m ²	2 時間	1
				イリノテカン	150 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI (2コース目以降)【末梢】	14		セツキシマブ	250 mg/m ²	1 時間	8
				イリノテカン	150 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 初回【末梢】	14		セツキシマブ	250 mg/m ²	1 時間	8
				セツキシマブ	400 mg/m ²	2 時間	1
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6(2コース目以降)【末梢】	14		セツキシマブ	250 mg/m ²	1 時間	8
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 初回 アレルギー対策版【末梢】	14		セツキシマブ	250 mg/m ²	1 時間	8
				セツキシマブ	400 mg/m ²	2 時間	1
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6(2コース目以降)アレルギー対策版【末梢】	14		セツキシマブ	250 mg/m ²	1 時間	8
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	sLV5FU2【末梢】	14		セツキシマブ	250 mg/m ²	1 時間	8
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
				レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
食道がん(消)	DCF(ドセタキセル, 5FU, CDDP併用)	21		シスプラチン	60 mg/m ²	2 時間	1
				ドセタキセル	60 mg/m ²	1 時間	1
食道がん(消)	DCF(ドセタキセル分割)	28		フルオロウラシル	600 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,5
				シスプラチン	80 mg/m ²	2 時間	1
				ドセタキセル	30 mg/m ²	1 時間	1
				フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,5
食道がん(消)	ドセタキセル	21		ドセタキセル	30 mg/m ²	1 時間	15
食道がん(消)	ドセタキセル+ネダプラチン	14		ドセタキセル	70 mg/m ²	1 時間	1
				ネダプラチン	40 mg/m ²	1 時間	1
食道がん(消)	FP(5FU 1000/CDDP 75)+RT(50.4Gy) RTOG	56		ドセタキセル	30 mg/m ²	1 時間	1
				フルオロウラシル	1000 mg/m ²	24 時間	1-4,29-32
食道がん(消)	FP(5FU 400/CDDP 40)+RT	35		シスプラチン	75 mg/m ²	2 時間	1,29
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	24 時間	1-5,8,-12
食道がん(消)	FP(5FU 700/CDDP 70)+RT(60Gy)	56		シスプラチン	40 mg/m ²	2 時間	1,8
				フルオロウラシル	700 mg/m ²	24 時間	1-4,29,-32
食道がん(消)	FP(5FU 800/CDDP 80)	28		シスプラチン	70 mg/m ²	2 時間	1,29
				フルオロウラシル	80 mg/m ²	2 時間	1
食道がん(消)	5FU+ネダプラチン	28		フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1-5
				ネダプラチン	90 mg/m ²	2 時間	1
食道がん(消)	mFOLFOX6【ポート】(食道癌)	14		フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1-5
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
食道がん(消)	mFOLFOX6(アレルギー対策版)【ポート】(食道癌)	14		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
食道がん(消)	mFOLFOX6【末梢】(食道癌)	14		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
食道がん(消)	mFOLFOX6(アレルギー対策版)【末梢】(食道癌)	14		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
				フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
食道がん(消)	NAC DNF	21		レボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	400 mg/m ²	24 時間	1-5,8-12
				ネダプラチン	50 mg/m ²	1 時間	1,8
				ドセタキセル	30 mg/m ²	1 時間	1,8
食道がん(消)	ニボルマブ(食道癌)	14		ニボルマブ	240 mg	30 分	1
食道がん(消)	ニボルマブ(食道癌)【4週毎】	28		ニボルマブ	480 mg	30 分	1
食道がん(消)	ニボルマブ+FP(5FU 800/CDDP 80)	28		シスプラチン	80 mg/m ²	2 時間	1
				ニボルマブ	240 mg	30 分	1,15
				フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,5
食道がん(消)	ニボルマブ【4週毎】+FP(5FU 800/CDDP 80)	28		ニボルマブ	480 mg	30 分	1
				シスプラチン	80 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,5
食道がん(消)	ニボルマブ+イピリムマブ	42		イピリムマブ	1 mg/kg	30 分	1
				ニボルマブ	240 mg	30 分	1,15,29
食道がん(消)	ベムブロシズマブ+FP(5FU 800/CDDP 80)	21		ベムブロシズマブ	200 mg	30 分	1
				シスプラチン	80 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1-5
食道がん(消)	ベムブロシズマブ+5-FU	21		ベムブロシズマブ	200 mg	30 分	1
				フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,5
食道がん(消)	weeklyPTX	56		パクリタキセル注	100 mg/m ²	1 時間	1,8,15,22,29,36
食道がん(消)	UDON	28		ネダプラチン	90 mg/m ²	1 時間	1
				ドセタキセル	35 mg/m ²	1 時間	1
				フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,5
				ドセタキセル	35 mg/m ²	1 時間	15
肛門管癌	CBDCa①+PTX①⑧⑩	28		カルボプラチン	5 AUC	1 時間	1
				フルオロウラシル	80 mg/m ²	1 時間	1,8,15
肛門管癌	FP(5FU 1000/CDDP 60)	21		シスプラチン	60 mg/m ²	2 時間	1
				フルオロウラシル	1000 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4
肛門管癌	FP(5FU 1000/CDDP 75)+RT	56		フルオロウラシル	1000 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,29,30,31,32
				シスプラチン	75 mg/m ²	2 時間	1,29
臓臓・胆道癌(消)	GS療法【低用量(S-1:60mg/m ²)レジメン】	21		S-1	60 mg/m ² (体表面積別)	1-14	
				ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1,8
臓臓・胆道癌(消)	GS療法【通常量(S-1:80mg/m ²)レジメン】	21		S-1	80 mg/m ² (体表面積別)	1-14	
				ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1,8
臓臓・胆道癌(消)	CDDP①⑧+GEM①⑧	21		ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1,8

膵臓・胆道癌(消)	ODDP①⑧+GEM①⑧ short hydration	21	シスプラチン	25 mg/m ²	1 時間	1,8
			ゲムシタビン	1000 mg/m ²	30 分	1,8
膵臓・胆道癌(消)	ODDP①⑧+GEM①⑧+デュルバルマブ① short hydration	21	シスプラチン	25 mg/m ²	1 時間	1,8
			デュルバルマブ	1500 mg	60 分	1
			ゲムシタビン	1000 mg/m ²	30 分	1,8
			シスプラチン	25 mg/m ²	1 時間	1,8
膵臓・胆道癌(消)	デュルバルマブ(胆道癌)	28	デュルバルマブ	1500 mg	60 分	1
膵臓・胆道癌(消)	FOLFIRINOX【ポート】	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
			イリノチカン	180 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
膵臓・胆道癌(消)	FOLFIRINOX【末梢】	14	レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
			オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
			イリノチカン	180 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
膵臓・胆道癌(消)	mFOLFIRINOX【ポート】	14	レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
			オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
			イリノチカン	150 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	mFOLFIRINOX【末梢】	14	レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
			オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
			イリノチカン	150 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	FOLFIRINOX(アレルギー対策版)【ポート】	14	レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
			オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
			イリノチカン	180 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
膵臓・胆道癌(消)	FOLFIRINOX(アレルギー対策版)【末梢】	14	レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
			オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
			イリノチカン	180 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
膵臓・胆道癌(消)	mFOLFIRINOX(アレルギー対策版)【ポート】	14	レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
			オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
			イリノチカン	150 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	mFOLFIRINOX(アレルギー対策版)【末梢】	14	レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
			オキサリプラチン	85 mg/m ²	4 時間	1
			イリノチカン	150 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	GCS short hydration	14	レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
			ゲムシタビン	1000 mg/m ²	30 分	1
			シスプラチン	25 mg/m ²	1 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	GEM	28	S-1	80 mg/m ² (体表面積別)	1-7	
膵臓・胆道癌(消)	nab-PTX①⑧⑩+GEM①⑧⑩	28	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	30 分	1,8,15
			アルブミン懸濁型パクリタキセル	125 mg/m ²	30 分	1,8,15
膵臓・胆道癌(消)	nal-IRI+LV/5FU【ポート】	14	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	30 分	1,8,15
			イリノチカン塩酸塩水和物	70 mg/m ²	90 分	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	nal-IRI+LV/5FU【末梢】	14	レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
			イリノチカン塩酸塩水和物	70 mg/m ²	90 分	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1