

【消化器グループ (消化器内科・外科)]レジメナー一覧 (2024年3月 時点)

がん種	レジメナー名	コース期間	薬品	基準値	投与時間	Day
MSI-Highを有する固形腫瘍 (消)	ヘムフロキサマブ	21	ムムプロキサマブ	200 mg	30 分	
MSI-Highを有する固形腫瘍 (消)	ヘムフロキサマブ (6週毎)	42	ムムプロキサマブ	400 mg	30 分	
胃がん (外)	胃がん術後 S-1 + DTX	21	ドセタキセル S-1	40 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	1 時間	1-14
胃がん (消)	ODDP+S-1	35	S-1 シクプラチン	80 mg/m ² 60 mg/m ²	2 時間	1-21
胃がん (消)	CPT-11 (A法) (胃癌)	35	イリノチカン	100 mg/m ²	90 分	1,8,15,22
胃がん (消)	CPT-11 (B法) (胃癌)	49	イリノチカン	150 mg/m ²	90 分	1,15,29
胃がん (消)	ドセタキセル	21	ドセタキセル	60 mg/m ²	1 時間	1
胃がん (消)	mFOLFOX6【ポート】 (胃癌)	14	オキサリプラチン フルオロウラシル レボリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	2 時間 46 時間 10 分	1
胃がん (消)	mFOLFOX6 (アレルギー対策版)【ポート】(胃癌)	14	オキサリプラチン フルオロウラシル レボリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ²	4 時間 46 時間 10 分	1
胃がん (消)	Nab-PTX①	21	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260 mg/m ²	30 分	1
胃がん (消)	Nab-PTX①⑧⑯	28	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m ²	30 分	1,8,15
胃がん (消)	ニボルマブ	14	ニボルマブ	240 mg	30 分	1
胃がん (消)	ニボルマブ (4週毎)	28	ニボルマブ	480 mg	30 分	1
胃がん (消)	ニボルマブ+SOX	21	オキサリプラチン ニボルマブ	100 mg/m ² 360 mg	2 時間 30 分	1
胃がん (消)	ニボルマブ+SOX アレルギー対策版	21	オキサリプラチン ニボルマブ	100 mg/m ² 360 mg	4 時間 30 分	1-14
胃がん (消)	ニボルマブ+mFOLFOX6【ポート】	14	オキサリプラチン ニボルマブ	85 mg/m ² 240 mg	2 時間 30 分	1-14
胃がん (消)	ニボルマブ+mFOLFOX6 (アレルギー対策版)【ポート】	14	オキサリプラチン ニボルマブ	85 mg/m ² 240 mg	2 時間 30 分	1
胃がん (消)	weekly PTX	28	パクリタキセル	80 mg/m ²	1 時間	1,8,15
胃がん (消)	ラムシルマブ	14	ラムシルマブ	8 mg/kg	1 時間	1
胃がん (消)	ラムシルマブ+Weekly PTX	28	ラムシルマブ	8 mg/kg	1 時間	1,15
胃がん (消)	ラムシルマブ①⑯+Nab-PTX①⑧⑯	28	ラムシルマブ パクリタキセル	80 mg/m ² 8 mg/kg	1 時間 1 時間	1,8,15 1,15
胃がん (消)	ラムシルマブ+CPT-11	14	ラムシルマブ イリノチカン	8 mg/kg 150 mg/m ²	1 時間 90 分	1,8,15 1
胃がん (消)	ラムシルマブ+ロンサーフ	28	ラムシルマブ ロンサーフ	8 mg/kg 70 mg/m ² (体表面積別)	1 時間 30 分	1,8,15 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12
胃がん (消)	RPM【ポート】	56	フルオロウラシル レボリナート	600 mg/m ² 250 mg/m ²	10 分 2 時間	15 1,8,15,22,29,36
胃がん (消)	SOX (胃癌)	21	オキサリプラチン S-1	100 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	2 時間 4 時間	1 1-14
胃がん (消)	SOX (胃癌) アレルギー対策版	21	オキサリプラチン S-1	100 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	4 時間 2 時間	1 1-14
胃がん (消)	トラスツズマブ B法 初回	21	トラスツズマブ	8 mg/kg	90 分	1
胃がん (消)	トラスツズマブ B法 2回目以降	21	トラスツズマブ	8 mg/kg	30 分	1
胃がん (消)	トラスツズマブ デルクステカン (胃がん)	21	トラスツズマブ デルクステカン	6.4 mg/kg	90 分	1
胃がん (消)	XELOX	21	オキサリプラチン カベシタピン	130 mg/m ² 2400 mg/m ² (体表面積別)	2 時間 4 時間	1 1-14
胃がん (消)	XELOX (アレルギー対策版)	21	オキサリプラチン カベシタピン	130 mg/m ² 2400 mg/m ² (体表面積別)	4 時間 4 時間	1 1-14
胃がん (消)	ニボルマブ+XELOX	21	オキサリプラチン ニボルマブ	130 mg/m ² 360 mg	2 時間 30 分	1
胃がん (消)	ニボルマブ+XELOX (アレルギー対策版)	21	オキサリプラチン ニボルマブ	130 mg/m ² 360 mg	4 時間 30 分	1-14
胃がん (消)	XP	21	オキサリプラチン カベシタピン	130 mg/m ² 2400 mg/m ² (体表面積別)	2 時間 2 時間	1 1-14
胃がん (消)	mFOLFOX6【末梢】(胃癌)	14	オキサリプラチン フルオロウラシル レボリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	2 時間 46 時間 10 分	1
胃がん (消)	mFOLFOX6 (アレルギー対策版)【末梢】(胃癌)	14	オキサリプラチン フルオロウラシル レボリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	4 時間 46 時間 10 分	1
胃がん (消)	RPM【末梢】	56	フルオロウラシル レボリナート	200 mg/m ² 600 mg/m ²	2 時間 10 分	1,8,15,22,29,36
胃がん (消)	ニボルマブ+mFOLFOX6【末梢】	14	オキサリプラチン ニボルマブ	85 mg/m ² 240 mg	2 時間 30 分	1
肝臓がん	アテゾリズマブ+BEV	21	アテゾリズマブ ベバシズマブ	1200 mg 15 mg/kg	60 分 90 分	1
肝臓がん	肝動注 (エビルピシン/イオメロン)	1	エビルピシン (肝動注用/イオメロン)	10 mg		1
肝臓がん	肝動注 (エビルピシン/イオメロン)【追加用】	1	エビルピシン (肝動注用/イオメロン)	10 mg		1
肝臓がん	肝動注 (エビルピシン/イオメロン)	1	エビルピシン (肝動注用/イオメロン)	10 mg		1
肝臓がん	肝動注 (エビルピシン/イオメロン)【追加用】	1	エビルピシン (肝動注用/イオメロン)	10 mg		1
肝臓がん	肝動注 (エビルピシン/オプテレイ)	1	エビルピシン (肝動注用/オプテレイ)	10 mg		1
肝臓がん	肝動注 (エビルピシン/オプテレイ)【追加用】	1	エビルピシン (肝動注用/オプテレイ)	10 mg		1
肝臓がん	肝動注 (エビルピシン/DOビーズ)	1	エビルピシン	50 mg		1
肝臓がん	肝動注 (エビルピシン/DOビーズ)【追加用】	1	エビルピシン	50 mg		1
肝臓がん	肝動注 (アイエーコール)	1	動注用アイエーコール (肝動注)	65 mg/m ²		1
肝臓がん	肝動注 (アイエーコール)【追加用】	1	動注用アイエーコール (肝動注)	65 mg/m ²		1
肝臓がん	RAM	14	ラムシルマブ	8 mg/kg	1 時間	1
肝臓がん	デュルバルマブ+トレメリムマブ (BW>30kg) 1コース目	28	デュルバルマブ トレメリムマブ	300 mg 1500 mg	1 時間 1 時間	1
肝臓がん	デュルバルマブ+トレメリムマブ (BW>30kg) 2コース目以降	28	デュルバルマブ トレメリムマブ	1500 mg 4 mg/kg	1 時間 1 時間	1
肝臓がん	デュルバルマブ+トレメリムマブ (BW≤30kg) 1コース目	28	デュルバルマブ トレメリムマブ	20 mg/kg 20 mg/kg	1 時間 1 時間	1
肝臓がん	デュルバルマブ+トレメリムマブ (BW≤30kg) 2コース目以降	28	デュルバルマブ トレメリムマブ	20 mg/kg 20 mg/kg	1 時間 1 時間	1
結腸・直腸がん (消)	XELOX	21	オキサリプラチン カベシタピン	130 mg/m ² 2400 mg/m ² (体表面積別)	2 時間 4 時間	1 1-14
結腸・直腸がん (消)	XELOX (アレルギー対策版)	21	オキサリプラチン カベシタピン	130 mg/m ² 2400 mg/m ² (体表面積別)	4 時間 4 時間	1 1-14
結腸・直腸がん (消)	アフリベルセプト+FOLFIRI【ポート】	14	アフリベルセプト ベータ イリノチカン	4 mg/kg 150 mg/m ²	1 時間 2 時間	1
結腸・直腸がん (消)	BEV+FOLFIRI【ポート】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル レボリナート ベバシズマブ	2400 mg/m ² 200 mg/m ² 200 mg/m ² 5 mg/kg	46 時間 10 分 2 時間 30 分	1
結腸・直腸がん (消)	BEV+FOLFIRI (ポート)	14	フルオロウラシル フルオロウラシル レボリナート ベバシズマブ	2400 mg/m ² 200 mg/m ² 200 mg/m ² 5 mg/kg	46 時間 10 分 2 時間 30 分	1
結腸・直腸がん (消)	BEV+IRIS(4週毎)	28	ベバシズマブ イリノチカン	5 mg/kg 100 mg/m ²	90 分	1,15
結腸・直腸がん (消)	BEV+IRIS(3週毎)	21	S-1 ベバシズマブ	80 mg/m ² (体表面積別) 5 mg/kg	10 分	1-14
結腸・直腸がん (消)	BEV+mFOLFOX6【ポート】	14	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	30 分 2 時間 46 時間 10 分	1-14
結腸・直腸がん (消)	BEV+mFOLFOX6 アレルギー対策版【ポート】	14	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	30 分 2 時間 46 時間 10 分	1
結腸・直腸がん (消)	BEV+sLVFU2【ポート】	14	ベバシズマブ フルオロウラシル フルオロウラシル レボリナート	5 mg/kg 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	30 分 46 時間 10 分 2 時間	1
結腸・直腸がん (消)	BEV+SOX	21	ベバシズマブ オキサリプラチン	5 mg/kg 130 mg/m ²	10 分 2 時間	1
結腸・直腸がん (消)	BEV+SOX アレルギー対策版	21	S-1 ベバシズマブ オキサリプラチン	80 mg/m ² (体表面積別) 7.5 mg/kg 130 mg/m ²	30 分 4 時間	1-14
結腸・直腸がん (消)	BEV+XELOX	21	S-1 ベバシズマブ オキサリプラチン	80 mg/m ² (体表面積別) 7.5 mg/kg 130 mg/m ²	30 分 4 時間	1-14

結腸・直腸がん(消)	BEV+XELOX アレルギー対策版	21	カベシタピン ペバシズマブ オキサリプラチン	2400 mg/m ² (体表面積別) 7.5 mg/kg 130 mg/m ²	30 分 4 時間	1-14 1 1
結腸・直腸がん(消)	BEV+FOLFOXIRI 【ポート】	14	カベシタピン ペバシズマブ オキサリプラチン イリノチカン	2400 mg/m ² (体表面積別) 5 mg/kg 85 mg/m ² 165 mg/m ²	30 分 2 時間 1 時間 1 時間	1-14 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	BEV+FOLFOXIRI(アレルギー対策版) 【ポート】	14	フルオロウラシル レボホリナート ペバシズマブ オキサリプラチン イリノチカン フルオロウラシル	200 mg/m ² 200 mg/m ² 5 mg/kg 85 mg/m ² 165 mg/m ² 3200 mg/m ²	2 時間 2 時間 30 分 4 時間 1 時間 48 時間	1 1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	BEV+ロンサーフ	28	フルオロウラシル ペバシズマブ ロンサーフ	200 mg/m ² 5 mg/kg 70 mg/m ² (体表面積別)	2 時間 30 分 10 分	1 1 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12
結腸・直腸がん(消)	BEV+XELIRI	21	ペバシズマブ イリノチカン カベシタピン	5 mg/kg 7.5 mg/kg 200 mg/m ²	10 分 30 分 90 分	15 1 1
結腸・直腸がん(消)	CPT-11 (A法)(結腸・直腸がん)	35	イリノチカン	100 mg/m ² (体表面積別)	90 分	1,8,15,22
結腸・直腸がん(消)	CPT-11 (B法)(結腸・直腸がん)	49	イリノチカン	150 mg/m ²	90 分	1,15,29
結腸・直腸がん(消)	FOLFIRI 【ポート】	14	イリノチカン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	150 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	2 時間 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOXIRI 【ポート】	14	オキサリプラチン イリノチカン フルオロウラシル	85 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ²	2 時間 1 時間 48 時間	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOXIRI 【末梢】	14	レボホリナート オキサリプラチン イリノチカン フルオロウラシル	200 mg/m ² 85 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ²	2 時間 1 時間 1 時間 48 時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOXIRI(アレルギー対策版) 【ポート】	14	オキサリプラチン イリノチカン フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	2 時間 1 時間 4 時間 2 時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOXIRI(アレルギー対策版) 【末梢】	14	オキサリプラチン イリノチカン フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ² 200 mg/m ²	4 時間 1 時間 48 時間 2 時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	IRIS	28	イリノチカン	125 mg/m ²	90 分	1,15
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOX6 【ポート】	14	S-1 オキサリプラチン フルオロウラシル	80 mg/m ² (体表面積別) 85 mg/m ² 2400 mg/m ²	1 時間 2 時間 46 時間	1-14 1 1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOX6(アレルギー対策版) 【ポート】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート オキサリプラチン	400 mg/m ² 200 mg/m ² 200 mg/m ² 85 mg/m ²	10 分 2 時間 4 時間 4 時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	ニボルマブ(大腸癌)	14	フルオロウラシル レボホリナート	2400 mg/m ² 400 mg/m ²	10 分 2 時間	1 1
結腸・直腸がん(消)	ニボルマブ(大腸癌)【4週毎】	28	ニボルマブ	240 mg	30 分	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+CPT11	14	イリノチカン	150 mg/m ²	90 分	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+FOLFIRI 【ポート】	14	パニツムマブ イリノチカン フルオロウラシル	6 mg/kg 150 mg/m ² 2400 mg/m ²	1 時間 2 時間 46 時間	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+mFOLFOX6 【ポート】	14	フルオロウラシル パニツムマブ レボホリナート	400 mg/m ² 6 mg/kg 200 mg/m ²	10 分 1 時間 2 時間	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+mFOLFOX6 (アレルギー対策版) 【ポート】	14	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル パニツムマブ	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 6 mg/kg	2 時間 4 時間 10 分 1 時間 1 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ単独	14	レボホリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+IRIS	28	パニツムマブ イリノチカン	6 mg/kg 100 mg/m ²	1 時間 90 分	1,15 1,15
結腸・直腸がん(消)	triweekly ヘルツマブ+トラスツズマブ(初回)	21	トラスツズマブ	80 mg/m ² (体表面積別) 8 mg/kg	90 分	1-14
結腸・直腸がん(消)	triweekly ヘルツマブ+トラスツズマブ(2回目以降)	21	ヘルツマブ トラスツズマブ ヘルツマブ	840 mg 6 mg/kg 420 mg	1 時間 30 分 30 分	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	ラムシムマブ+FOLFIRI 【ポート】	14	ラムシムマブ イリノチカン フルオロウラシル	8 mg/kg 150 mg/m ² 2400 mg/m ²	1 時間 2 時間 46 時間	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ 初回	7	フルオロウラシル レボホリナート	400 mg/m ² 200 mg/m ²	10 分 2 時間	1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ 2回目以降	7	セツキシマブ	400 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ (biweekly)	14	セツキシマブ	250 mg/m ²	1 時間	8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+CPT11 初回	14	セツキシマブ イリノチカン	500 mg/m ² 400 mg/m ² 150 mg/m ²	120 分 2 時間 90 分	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+CPT11(2コース目以降)	14	セツキシマブ イリノチカン	250 mg/m ² 150 mg/m ²	1 時間 90 分	1 8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI 初回 【ポート】	14	セツキシマブ イリノチカン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	400 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	2 時間 2 時間 46 時間 10 分 2 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI (2コース目以降) 【ポート】	14	フルオロウラシル イリノチカン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	250 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	1 時間 2 時間 46 時間 10 分 2 時間	8 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 初回 【ポート】	14	セツキシマブ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	400 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	2 時間 2 時間 46 時間 10 分 2 時間	1,8 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6(2コース目以降) 【ポート】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル セツキシマブ	400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 250 mg/m ²	2 時間 2 時間 2 時間 2 時間 1 時間	8 1 1 1 8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 初回 アレルギー対策版 【ポート】	14	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	2 時間 46 時間 10 分 2 時間 2 時間	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 初回 アレルギー対策版 【ポート】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル セツキシマブ	250 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 250 mg/m ²	1 時間 2 時間 2 時間 2 時間 1 時間	8 1 1 1 8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6(2コース目以降)アレルギー対策版 【ポート】	14	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル セツキシマブ	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 250 mg/m ²	4 時間 46 時間 10 分 2 時間 2 時間 1 時間	8 1 1 1 1 8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+SOX 初回	21	セツキシマブ オキサリプラチン フルオロウラシル	400 mg/m ² 130 mg/m ² 130 mg/m ²	2 時間 2 時間 2 時間	1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+SOX (2コース目以降)	21	S-1 セツキシマブ オキサリプラチン	80 mg/m ² (体表面積別) 250 mg/m ² 130 mg/m ²	1 時間 1 時間 2 時間	1-14 8,15 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+SOX (2コース目以降)アレルギー対策版	21	セツキシマブ オキサリプラチン	250 mg/m ² 130 mg/m ²	1 時間 4 時間	1,8,15 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI (biweekly) 【ポート】	14	S-1 セツキシマブ セツキシマブ イリノチカン	80 mg/m ² (体表面積別) 250 mg/m ² 500 mg/m ² 150 mg/m ²	1 時間 1 時間 120 分 2 時間	1-14 1,8,15 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI (biweekly) 【末梢】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	46 時間 10 分 10 分 2 時間	1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 (biweekly) 【ポート】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル セツキシマブ	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 500 mg/m ²	46 時間 10 分 10 分 2 時間 120 分	1 1 1 1 1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 (biweekly) 【ポート】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル レボホリナート	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	46 時間 10 分 10 分 2 時間 2 時間	1 1 1 1 1

結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 (bimeweekly) 【未構】	14	レボリナート セツキシマブ オキサリプラチン フルオロウラシル	200 mg/m ² 500 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ²	2 時間 120 分 2 時間 46 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 (bimeweekly) アレルギー対策版 【ポート】	14	レボリナート セツキシマブ オキサリプラチン フルオロウラシル	200 mg/m ² 500 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ²	2 時間 120 分 4 時間 46 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 (bimeweekly) アレルギー対策版 【未構】	14	レボリナート セツキシマブ オキサリプラチン フルオロウラシル	200 mg/m ² 500 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ²	2 時間 120 分 4 時間 46 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ (初回)	7	セツキシマブ	400 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ (2回目以降)	7	セツキシマブ	250 mg/m ²	1 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ (bimeweekly)	14	セツキシマブ	500 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	sLV5FU2 【ポート】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル レボリナート	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	46 時間 10 分 2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	SOX(結腸・直腸がん)	21	オキサリプラチン	130 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	SOX(結腸・直腸がん) アレルギー対策版	21	オキサリプラチン S-1	130 mg/m ² 80 mg/m ² (体表面積別)	4 時間	1-14
結腸・直腸がん(消)	アフリベルセプト+FOLFIRI 【未構】	14	アフリベルセプト ベータ イリノタカン フルオロウラシル	4 mg/kg 150 mg/m ² 2400 mg/m ²	1 時間 2 時間 46 時間	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+FOLFIRI 【未構】	14	フルオロウラシル レボリナート ペバシズマブ イリノタカン	400 mg/m ² 200 mg/m ² 5 mg/kg 150 mg/m ²	10 分 2 時間 30 分 2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+mFOLFOX6 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル レボリナート ペバシズマブ	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ² 5 mg/kg	46 時間 10 分 2 時間 30 分	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+mFOLFOX6 アレルギー対策版 【未構】	14	オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル レボリナート	85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	2 時間 46 時間 10 分 2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+sLV5FU2 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル ペバシズマブ	2400 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 5 mg/kg	46 時間 46 時間 10 分 30 分	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+FOLFOLXIRI 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル レボリナート ペバシズマブ	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ² 5 mg/kg	46 時間 10 分 2 時間 30 分	1
結腸・直腸がん(消)	BEV+FOLFOLXIRI(アレルギー対策版) 【未構】	14	オキサリプラチン イリノタカン フルオロウラシル レボリナート	85 mg/m ² 165 mg/m ² 3200 mg/m ² 200 mg/m ²	2 時間 1 時間 48 時間 2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	FOLFIRI 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ² 200 mg/m ² 2400 mg/m ²	46 時間 10 分 2 時間 2 時間 2 時間 46 時間	1
結腸・直腸がん(消)	mFOLFOX6 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	46 時間 10 分 2 時間 46 時間	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+FOLFIRI 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル パニツムマブ	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 6 mg/kg	46 時間 10 分 2 時間 2 時間 2 時間 1 時間	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+mFOLFOX6 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル パニツムマブ	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 6 mg/kg	46 時間 10 分 2 時間 2 時間 2 時間 1 時間	1
結腸・直腸がん(消)	パニツムマブ+mFOLFOX6 (アレルギー対策版) 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル パニツムマブ	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 6 mg/kg	46 時間 10 分 2 時間 2 時間 2 時間 1 時間	1
結腸・直腸がん(消)	ラムシルマブ+FOLFIRI 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル ラムシルマブ	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 8 mg/kg	46 時間 10 分 2 時間 2 時間 2 時間 1 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI 初回 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル セツキシマブ	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ²	46 時間 10 分 2 時間 2 時間 2 時間 2 時間	1
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+FOLFIRI (2コース目以降) 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル セツキシマブ	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 250 mg/m ²	46 時間 10 分 2 時間 2 時間 2 時間 1 時間	8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6 初回 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル セツキシマブ	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ²	46 時間 10 分 2 時間 2 時間 2 時間 2 時間	1,8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6(2コース目以降) 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル セツキシマブ	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 250 mg/m ²	46 時間 10 分 2 時間 2 時間 2 時間 1 時間	8
結腸・直腸がん(消)	セツキシマブ+mFOLFOX6(2コース目以降)アレルギー対策版 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル セツキシマブ	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 250 mg/m ²	46 時間 10 分 2 時間 2 時間 2 時間 1 時間	1,8
結腸・直腸がん(消)	sLV5FU2 【未構】	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	46 時間 10 分 2 時間 2 時間	1
結腸・直腸がん(外)	ニボルマブ+イピリムマブ	21	レボリナート	240 mg/m ²	2 時間	1
結腸・直腸がん(外)	UFT/LV+BEV	28	ニボルマブ イピリムマブ ペバシズマブ	1 mg/kg 1 mg/kg 5 mg/kg	30 分 30 分 30 分	1,15
食道がん(消)	DCF(ドセタキセル, 5FU, CDDP併用)	21	ドセタキセル 5FU シスプラチン	300 mg/m ² (体表面積別) 60 mg/m ² 60 mg/m ²	2 時間 1 時間 1 時間	1-21
食道がん(消)	DCF(ドセタキセル分割)	28	ドセタキセル シスプラチン ドセタキセル フルオロウラシル	60 mg/m ² 80 mg/m ² 30 mg/m ² 800 mg/m ²	2 時間 2 時間 1 時間 24 時間	1,2,3,4,5
食道がん(消)	ドセタキセル	21	ドセタキセル	30 mg/m ²	1 時間	15
食道がん(消)	ドセタキセル+ネダプラチン	14	ドセタキセル ネダプラチン	30 mg/m ² 40 mg/m ²	1 時間 1 時間	1
食道がん(消)	FP(5FU 1000/CDDP 75) +RT(50.4Gy) RTOG	56	フルオロウラシル シスプラチン	1000 mg/m ² 75 mg/m ²	24 時間 2 時間	1,2,3,4,29,30,31,32
食道がん(消)	FP(5FU 700/CDDP 70) +RT(60Gy)	56	フルオロウラシル シスプラチン	700 mg/m ² 70 mg/m ²	24 時間 2 時間	1,2,9
食道がん(消)	FP(5FU 800/CDDP 80)	28	シスプラチン	80 mg/m ²	2 時間	1
食道がん(消)	5FU+ネダプラチン	28	フルオロウラシル ネダプラチン	800 mg/m ² 90 mg/m ²	24 時間 2 時間	1,2,3,4,5
食道がん(消)	mFOLFOX6【ポート】(食道癌)	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル	800 mg/m ² 90 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	24 時間 2 時間 2 時間 46 時間 10 分 2 時間	1,2,3,4,5
食道がん(消)	mFOLFOX6(アレルギー対策版)【ポート】(食道癌)	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	46 時間 10 分 2 時間 2 時間 2 時間 2 時間	1
食道がん(消)	mFOLFOX6【未構】(食道癌)	14	フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル	2400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 400 mg/m ² 200 mg/m ²	46 時間 10 分 2 時間 2 時間 2 時間 2 時間	1

			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
			フルボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
食道がん(消)	NAC DNF	21	フルオロウラシル	400 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12
			ネダプラチン	50 mg/m ²	1 時間	1,8
			ドセタキセル	30 mg/m ²	1 時間	1,8
食道がん(消)	ニボルマブ(食道癌)	14	ニボルマブ	240 mg	30 分	1
食道がん(消)	ニボルマブ(食道癌)【4週毎】	28	ニボルマブ	480 mg	30 分	1
食道がん(消)	ニボルマブ+FP(5FU 800/CDDP 80)	28	シスプラチン	80 mg/m ²	2 時間	1
			ニボルマブ	240 mg	30 分	1,15
食道がん(消)	ニボルマブ【4週毎】+FP(5FU 800/CDDP 80)	28	フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,5
			ニボルマブ	480 mg	30 分	1
			シスプラチン	80 mg/m ²	2 時間	1
食道がん(消)	ニボルマブ+FP(5FU 800/CDDP 80)【5-FU 5日間持続投与】	28	フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,5
			シスプラチン	80 mg/m ²	2 時間	1
食道がん(消)	ニボルマブ【4週毎】+FP(5FU 800/CDDP 80)【5-FU 5日間持続投与】	28	フルオロウラシル	4000 mg/m ²	120 時間	1
			ニボルマブ	240 mg	30 分	1,15
			ニボルマブ	480 mg	30 分	1
			シスプラチン	80 mg/m ²	1 時間	1
食道がん(消)	ニボルマブ+イビリムマブ	42	フルオロウラシル	4000 mg/m ²	120 時間	1
			イビリムマブ	1 mg/kg	30 分	1
食道がん(消)	ベムプロリスマブ+FP(5FU 800/CDDP 80)	21	ニボルマブ	240 mg	30 分	1,15,29
			ベムプロリスマブ	200 mg	30 分	1
			シスプラチン	80 mg/m ²	2 時間	1
食道がん(消)	ベムプロリスマブ+5-FU	21	フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,5
			ベムプロリスマブ	200 mg	30 分	1
食道がん(消)	フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,5		
食道がん(外)	weeklyPTX	56	フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,5
食道がん(外)	少量持続ネダプラチン+5FU+RT	42	フルオロウラシル	100 mg/m ²	1 時間	1,8,15,22,29,36
			ネダプラチン	6 mg/m ²	30 分	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26
神経内分分泌腫瘍	ストレプトゾシン+5-FU 5日間連日	42	フルオロウラシル	350 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26
			ストレプトゾシン	500 mg/m ²	30 分	1,2,3,4,5
肛門管癌	CBDCa①+PTX①⑧⑫	28	フルオロウラシル	400 mg/m ²	2 時間	1,2,3,4,5
			カルボプラチン	5 AUC	1 時間	1
肛門管癌	FP(5FU 1000/CDDP 60)	21	フルオロウラシル	80 mg/m ²	1 時間	1,8,15
			フルボリナート	80 mg/m ²	2 時間	1
肛門管癌	FP(5FU 1000/CDDP 75)+RT	56	フルオロウラシル	1000 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4
			フルボリナート	1000 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,29,30,31,32
肛門管癌	5FU+MMC+RT	56	シスプラチン	75 mg/m ²	2 時間	1,29
			フルオロウラシル	800 mg/m ²	24 時間	1,2,3,4,29,30,31,32
			マイマイシンC	10 mg/m ²	5 分	1,29
肛門管癌	ニボルマブ(肛門扁平上皮癌)	14	ニボルマブ	240 mg	30 分	1
膵臓・胆道癌(消)	GS療法【低用量(S-1: 60mg/m ²) レジメン】	21	S-1	60 mg/m ² (体表面積別)	1-14	1,2,3,4
膵臓・胆道癌(消)	GS療法【通常量(S-1: 80mg/m ²) レジメン】	21	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1,8
			S-1	80 mg/m ² (体表面積別)	1-14	1-14
膵臓・胆道癌(消)	ODDP①⑧+GEM①⑧	21	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1,8
			ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1,8
膵臓・胆道癌(消)	ODDP①⑧+GEM①⑧ short hydration	21	シスプラチン	25 mg/m ²	1 時間	1,8
膵臓・胆道癌(消)	ODDP①⑧+GEM①⑧+デュルバルマブ① short hydration	21	デュルバルマブ	1500 mg	60 分	1
			ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1,8
膵臓・胆道癌(消)	デュルバルマブ(胆道癌)	28	シスプラチン	25 mg/m ²	1 時間	1,8
膵臓・胆道癌(消)	FOLFIRINOX【ポート】	14	デュルバルマブ	1500 mg	60 分	1
			オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
			イリノテカン	180 mg/m ²	2 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	FOLFIRINOX【未構】	14	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
			フルボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
			オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
			イリノテカン	180 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルオロウラシル	400 mg/m ²	10 分	1
膵臓・胆道癌(消)	mFOLFIRINOX【ポート】	14	フルボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
			オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
			イリノテカン	150 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	mFOLFIRINOX【未構】	14	フルボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
			オキサリプラチン	85 mg/m ²	2 時間	1
			イリノテカン	150 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	GCS short hydration	14	フルボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
			ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1
			シスプラチン	25 mg/m ²	1 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	GEM	28	ゲムシタピン	80 mg/m ² (体表面積別)	1,2,3,4,5,6,7	1,8,15
膵臓・胆道癌(消)	nab+PTX①⑧⑫+GEM①⑧⑫	28	アルブミン懸濁型フルボリナート	125 mg/m ²	30 分	1,8,15
膵臓・胆道癌(消)	nal-IRI+LV/5FU【ポート】	14	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	30 分	1,8,15
			イリノテカン	70 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1
膵臓・胆道癌(消)	nal-IRI+LV/5FU【未構】	14	イリノテカン	70 mg/m ²	2 時間	1
			フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1
			フルボリナート	200 mg/m ²	2 時間	1