高脂血症薬フォーミュラリ(HMG-CoA還元酵素阻害薬)

急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝癌、黄疸

症状なし		すべて strongスタチン			
		薬価	開始用量	最高用量	
第一推奨	ロスバスタチン錠2.5mg (先発品目:クレストール)	11.40円	2.5-5mg	20mg (CCr<30:5mg)	
	<ul style="list-style-type: none"> 水溶性ストロングスタチンで、相互作用が少ない 安価で、用量幅が大きく、調節しやすい 				
第二推奨	アトルバスタチン錠10mg (先発品名:リピートル)	13.90円	10mg	20mg (家族性40mg)	
	リバロ錠2mg	34.50円	1-2mg	4mg	
症状あり		standardスタチン			
		薬価	開始用量	最高用量	
第一推奨	プラバスタチンNa錠10mg (先発品目:メバロチン)	14.10円	10mg	20mg	
	<ul style="list-style-type: none"> 水溶性スタチン 重篤な肝障害時に唯一使用できるスタチン 				

オプション		strongスタチン			
※シクロスポリン併用あり⇒		薬価	開始用量	最高用量	
		第一推奨	フルバスタチン錠20mg (先発品目:ローコール)	19.90円	20mg