

★倉敷中央病院放射線診断科 紹介RI（一般核医学）検査一覧

| 部位    | 検査名                              | 核種                | 主な目的                | 備考                                                      |
|-------|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 脳     | 脳血流シンチ（IMP）                      | 123I-IMP          | 脳血流・認知症の診断          | 検査3日前より1週間ヨウ化カリウム50mg内服が望ましいです。<br>持続動脈採血を原則おこなう必要があります |
| 脳     | 脳血流シンチ(ECD)                      | 99mTc-ECD         | 脳血流・認知症の診断          |                                                         |
| 脳     | 脳ダットシンチ（FP-CIT）                  | 123I-FP-CIT       | パーキンソン病と本態性振戦の鑑別    | 薬液に5%エタノールを含みます。別途同意書が必要です                              |
| 心交感神経 | 心交感神経シンチ（MIBG）                   | 123I-MIBG         | パーキンソン病等の診断         | 検査3日前より1週間ヨウ化カリウム50mg内服が望ましいです                          |
| 甲状腺   | 甲状腺テクネシンチ+摂取率                    | 99mTcO4-          | 甲状腺機能測定             |                                                         |
| 副甲状腺  | 副甲状腺シンチ                          | 99mTc-MIBI        | 副甲状腺機能亢進症の診断        |                                                         |
| 副腎    | 副腎髄質シンチ                          | 123I-MIBG         | 褐色細胞腫、神経芽細胞腫の診断     | 検査3日前より1週間ヨウ化カリウム50mg内服が望ましいです。<br>連続して2日間の来院が必要です      |
| 肺     | 肺血流シンチ（+肺換気シンチ 99mTc-MAA（+81mKr） | 99mTc-MAA（+81mKr） | 肺塞栓症の診断             | 肺換気シンチを追加可能です                                           |
| 腎     | 腎静態シンチ                           | 99mTc-DMSA        | 腎の形態評価・摂取率          |                                                         |
| 腎     | 腎動態シンチ+レノグラム                     | 99mTc-DTPA        | 腎障害・尿路排泄障害の評価       |                                                         |
| 骨     | 骨シンチ                             | 99mTc-HMDP        | 骨転移の診断              | 体幹部SPECT/CTを追加可能です                                      |
| その他   | ガリウムシンチ                          | 67Ga              | 腫瘍・炎症の局在診断          | 注射3日（72時間）後に撮影します。撮影前日に下剤処方下さい                          |
| その他   | 唾液腺シンチ                           | 99mTcO4-          | シェーグレン症候群、ワルチン腫瘍の診断 |                                                         |
| その他   | メッケル憩室シンチ                        | 99mTcO4-          | メッケル憩室の存在診断         |                                                         |
| その他   | 消化管出血シンチ                         | 99mTc-HSA-D       | 消化管出血の部位診断          | 連続して2日間の来院が必要です                                         |

※その他の各種RI検査をご希望の場合、ご連絡ください。

※循環器科系RI検査（心筋シンチなど）につきましては、当院循環器内科にお問い合わせください。